





Jussieu (Bernard de) 1699-1777.

Manuscrit (vraisemblablement de la main d'un élève) du cours de botanique qu'il professait au Jardin du Roi en 1762









Jntroduction
a la
Connoissance
des
Plantes


YALE MEDICAL LIBRARY
HISTORICAL LIBRARY
Manuscript
18th
cent

Si Les Naturalistes anciens ~~[illegible]~~ qui ont ecrit sur les Plantes avoient Conçû qu'on ne pouvoit parvenir a les Connoître qu'en imaginant quelque methode qui apprît à les ranger dans des classes naturelles et faciles a determiner sur des caracteres certains, La Botanique seroit peutêtre aujourdhui a un point de perfection qui ne laisseroit rien a desirer. c'est faute d'avoir employé cet ordre methodique que tout ce qu'ils nous ont Laissé est devenû si peu instructif qu'a peine a-t-on pû reconnoître quelques unes des plantes dont ils avoient parlé. les efforts extraordinaires que les premiers Botanistes modernes ont faits pour connoître precisement les plantes auxquelles Theophraste, Dioscoride et Pline avoient donné des noms ont été utiles à la verité en ce qu'ils ont ranimés pour l'Etude de la Botanique un gout qui etoit demeuré eteint pendant des siecles entiers; mais ces hommes laborieux auroient rendu un bien plus grand Service si contents de recueillir dans les ouvrages des anciens ce qu'ils y pouvoient trouver de certain, de bon, et de facile à reconnoître, ils ne se fussent pas obstinés a y chercher un Thresor qu'ils ni pouvoient trouver, s'ils n'eussent consulté d'autre livre que celui de la nature, s'ils n'eussent examiné les plantes que sur pied et telles qu'elles sortent du sein de la terre

Si enfin par l'habitude de les comparer les uns avec les autres dans toutes leurs parties ils se fussent attachés a reconnoître quels étoient les caracteres qui devoient les faire ranger les unes avec les autres et quels etoient ceux qui pouvoient les distinguer.

Conrard Gesner Medecin natif de Zuric en Suisse est le 1.e qui ait reconnu que cette voie étoit la seule par la quelle on put parvenir à la veritable connoissance des plantes. C'étoit surtout par l'examen de toutes les parties de la fleur qu'il vouloit qu'on determina chaque genre des plantes et non par les feuilles et leur port exterieur. La Melisse de Constanti=nople (dit il) ressemble par ses feuilles à l'ortie morte, cependant elle en differe entierement par sa fleur et par la forme de sa semence. Gesner avoit fait toute sa vie une etude particuliere des plantes. il en avoit ramassé une quantité prodigieuse. partie qu'il avoit recueillie lui même dans les voyages qu'il avoit faits en Suisse, en Italie, en France, en allemagne et partie qui lui avoit eté envoyée par des personnes qui connoissoient son gout pour cette sorte d'étude. il se disposoit a donner un ouvrage fruit de ~~des~~ observations qu'il avoit faites à ce sujet pendant 30 années consecutives, lorsque la mort l'enleva prématurement n'étant encore agé que de 49 ans.

Presque en même tems Fabius Columna Prince Italien reconnut par l'Etude qu'il fit des Plantes qu'on ne pouvoit parvenir a les connoître qu'en les rangeant dans son ordre methodique. = je fais = peu de cas des feuilles (disoit il) pour determiner = le genre des plantes, car ce n'est pas par la = figure de leurs feuilles mais par celle des fleurs = et des semences que je decide de leur affinité.

C'est à Robert Morisson natif d'Aberdéen en Ecosse qu'est duë la gloire d'avoir le premier mis en pratique les principes de Gesner et de Columna. il proposa une methode par laquelle il établissoit la difference entre les genres des Plantes relativement à la forme des fruits. methode qui lui fit, pour lors, beaucoup d'honneur et qui lui en auroit fait d'avantage s'il avoit pris moins de soin de deguiser les veritables sources où il en avoit puisé l'idée.

• Cette methode portoit dans la Botanique un ordre qu'on n'y avoit pas encore vû jusqu'alors. Cependant elle étoit encore elle même sujette à un inconvenient. c'est qu'elle exigeoit qu'on attendit le fruit de chaque plante avant qu'on pût decider d'une maniere precise de quel genre elle étoit

Mr Tournefort sentant cette defectuosité, imagina une methode plus avantageuse et plus commode dans laquelle sans etre obligé d'att=
= endre le fruit de chaque plante et sur la seule

inspection de la fleur ou pur, sur le champ la rapporter à quelqu'une des classes qu'il a établies et ensuite à son genre particulier. cette methode consiste à ranger toutes les plantes dans un petit nombre de classes qu'il distingue eu égard à la forme des fleurs, et ensuite il renferme tous les genres particuliers dans ces diff^tes classes.

Pour constituer les classes il n'est besoin que d'une ressemblance commune entre toutes les fleurs d'une même classe. ainsi toutes les fleurs qui sont d'une seule piece et en gueule constituent la classe des fleurs en gueule qui renferme sous elle differents genres.

Pour établir les genres, outre une ressemblance exacte des fleurs entre toutes les especes d'un même genre il est de plus besoin d'une ressemblance entre les fruits. par exemple; les fleurs et les semences de toutes les especes de sauges doivent etre semblables entre elles demême que toutes les fleurs et les semences de toutes les especes de sclarées.

On distingue ensuite des genres du premier ordre et des genres du second ordre. ceux du 1.er ordre sont ceux qu'on peut distinguer de tout autre par par le seul caractere qu'on tire de la fleur et du fruit, et ce caractere est suffisant pour tous les genres qui n'ont pas une ressemblance assez parfaite avec quelqu'autre genre pour qu'on puisse les confondre ensemble. Par exemple. le genre des renoncules est

un genre du premier ordre parceque le caractere qui se tire de la ~~fleur~~ de la semence suffit pour le distinguer de tout autre.

Les genres du 2.^d ordre sont ceux qui ont entre eux une si parfaite ressemblance des fleurs et des fruits qu'on peut aisement les confondre ensorte quil faut avoir recours à quelqu'autre signe que ceux qui se tirent de la fleur et du fruit pour pouvoir les reconnoître. c'est ce qui s'observe à l'égard du Polium et du chamædrys les fleurs et les fruits sont tellement semblables dans ces deux genres, quils paroissent absolument n'en faire qu'un seul. cependant ils sont differents par un point. ~~c'est~~ c'est de l'arrangement et de la disposition des fleurs qu'on tire ce point de difference qui constitue un genre du second ordre. dans le chamædrys les fleurs naissent tout le long des tiges, dans le Polium les fleurs sont ramassées en paquets à la sommité des tiges.

On tire encore des differences generiques du second ordre du nombre et de la position des feuilles comme dans la quinte feuille, et dans les fraisiers. enfin on en peut tirer de toutes les parties des plantes lorsque les signes génériques du premier ordre sont insuffisants pour assurer la connoissance d'un genre, et c'est ce qui arrive quand plusieurs genres ont tant de ressemblance entre eux qu'on pourroit les confondre si l'on n'avoit recours à quelque difference generique

du second ordre.

A l'égard de la distinction des especes d'un même genre entre elles, c'est de toutes les parties, et de toutes les circonstances accidentelles qu'on y peut remarquer qu'elle se tire. Par exemple dans les renoncules, les unes sont a feuilles de chien dent, les autres sont a feuilles chevelües, certaines sont à feuilles de cyclamen et à racine d'asphodele. enfin comme ce genre est très abondant en especes, on designe chaque espece par une marque particuliere qui puisse la faire distinguer de toute autre.

Tout ce Systême cependant ne peut s'adapter qu'aux plantes qui ont des fleurs et des fruits; mais il ne peut avoir lieu pour celles qui n'ont aucune de ces parties, ou en qui elles sont imperceptibles telles sont beaucoup de fougeres, de capillaires, toutes les algues et tous les champignons. a legard de ces plantes on les range autant qu'il est possible dans leurs genres ayant égard à leurs parties les plus apparentes et les plus propres à constater leur caractere.

Pour mieux entendre les differentes divisions et les classes particulieres dans lesquelles on renferme toutes les plantes ou plutôt toutes les fleurs il est a propos de connoître quelles sont les parties qui concourent à leur formation les principales sont les Petales les Etamines le pistile le Calice.

Les petales en latin Petala sont ces especes de petites feuilles diversement Colorées que le vulgaire prend Specialement pour la fleur. on pourroit les appeller feuilles des fleurs; mais le terme de Petale est plus Commode et sert à les distinguer des feuilles proprement dites.

Les Etamines Stamina sont des especes de filaments qui occupent le fond des fleurs.. elles ont à leur extremité de petites masses de differentes formes qu'on nomme les Sommets ou les houpes apices.

On appelle Pistille Pistillum une partie qui occupe le Centre de la fleur, et qui se trouve comm=unement au milieu des Etamines

Le Calice enfin Calix est cette partie Solide qui se trouve audessous des petales.. quelque fois il ne sert que de Soutien aux petales et quelque fois il sert en même tems de Soutien aux petales et d'enveloppe pour le fruit

il faut cependant observer que ces differentes parties ne sont pas Constantes dans toutes les fleurs, Car il s'en trouve qui n'ont point de calice, d'autres qui n'ont point de petales et qui n'ont que des etamines et celles ci font une bande a part. enfin il y en a qui n'ont que le Pistille.

Les differentes divisions des fleurs se font ayant seulement égard a la forme du petale dans celles qui n'en ont qu'un, et ayant tout a la fois égard au nombre et à la forme des petales dans celles qui en ont plusieurs. voici quelles sont ces divisions.

La premiere division generale des fleurs est celle

par la quelle on les distingue toutes en fleurs a petales et en fleurs sans petales ou a étamines. on nomme en latin les fleurs a petales flores Petalodes ou flores petalis donati et les fleurs a etamines flores Staminei ou flores apetali

Les fleurs a étamines sont celles qui n'aiant que leurs étamines font une bande a part, parceque n'aiant point de petales, elles ne peuvent etre rangées dans aucune des classes aux quelles on doit rapporter les fleurs a petales. la Bistorte, l'Equisetum ou queüe de cheval et nombre d'autres plantes n'ont que des fleurs a étamines. on ne doit pas prendre pour petales dans une fleur de petites feuilles colorées qui soutiennent les étamines. ces petites feuilles ne sont precisement que des calices puisquelles ne tombent pas et quelles servent d'envelop[p]es aux semences jusqu'à ce quelles soient parvenuës a leur maturité

la premiere division des fleurs a petales est celle par la quelle on les divise a fleurs a petale d'une seule piece et a fleurs a petales de plusieurs pieces. on nomme d'un seul mot les fleurs a petale d'une seule piece fleurs mono=petales flores monopetali et on nomme aussi d'un seul mot les fleurs a petales de plusieurs pieces fleurs polypetales flores polypetali

La seconde division ou la subdivision des fleurs monopetales est celle par la quelle on les

distingue en fleurs monopetales regulieres et en fleurs monopetales irregulieres

Les fleurs monopetales regulieres sont celles dont toutes les parties ont une juste proportion et un rapport exact entre elles et cette subdivision renferme deux classes qui sont les fleurs en cloche flores campani formis et les fleurs en entonnoir flores infundibuli formis.

Les fleurs en cloche flores campani formis sont de 4 sortes. fleurs en cloche proprement dites, fleurs en cloches tubulées, fleurs en cloche evasées, et fleurs en cloche arrondies ou en forme de grelot.

On nomme fleur en cloche proprement dite flos campani formis une fleur monopetale dont le fond et les cotés sont de même largeur et dont l'entrée et la bouche n'a guere plus d'étenduë comme dans la campanule et la belladonna.

La fleur en cloche tubulée flos campani formis tubulatus est une fleur monopetale dont le fond et les côtés sont resserés comme dans le melinet et le sceau de Salomon

La fleur en cloche evasée flos campani formis, latus est une fleur monopetale dont les cotés et la bouche sont plus larges que le fond comme dans la mauve

La fleur en cloche arrondie ou en grelot flos campani formis globosus est une fleur monopetale dont l'ouverture ou la bouche est

plus etroite que le reste de la fleur telles sont les fleurs de l'arbousier, de la bruyere, du muguet blanc.

La classe des fleurs monopetales en entonnoir est aussi de 3 sortes de fleurs en entonnoir propre=ment dites. fleurs en forme de soucoupe, et fleurs en rosette ou en roue

La fleur en entonnoir proprement dite <u>flos infundibili formis</u> est une fleur monopetale dont la partie inferieure se termine en tube et dont la partie superieure s'élargit en entonnoir et represente la forme d'un Cône telles sont les fleurs de la belle de nuit, de la petite Centaurée du jasmin et de plusieurs autres

La fleur en entonnoir de la 2de sorte ou en forme de sous coupe <u>flos hypocraterí formis</u> est une fleur monopetale dont le tuyau s'élargit en disc et non en Cône telles sont les fleurs de la Primevere et de L'androsace ou sanghumain

Enfin la fleur en rosette ou en roue <u>flos rotatus</u> est une fleur monopetale dont la forme approche d'une rosette ou d'une roue par son arrondissement telles sont les fleurs de la bourrache du mouron, de la lysimachie et toutes celles qui ont la même Configuration

Les fleurs monopetales irregulieres <u>flores monopetali anomali</u> sont celles dont les parties ont une forme bizarre et heteroclite et dans la quelle on n'observe pas un rapport

de Simetrie et de proportion. cette Seconde Subdivision des fleurs monopetales renferme aussi deux classes qui sont la classe des fleurs en gueule et celle des fleurs en masque.

On appelle fleur en gueule flos labiatus une fleur monopetale qui se termine par sa partie inferieure en un petit tüiau et par sa partie superieure en une ou deux levres telle est la forme des fleurs dans la sauge, dans l'hormin, dans la sclarée et dans le Chamædrys. Ces fleurs n'ont pas une proportion simetrique entre leurs parties

La fleur en masque flos personatus est une fleur monopetale qui differe peu de la fleur en gueule par sa forme. le principal Caractere qui les distingue c'est que dans les fleurs en masque le pistille se change en une Capsule qui contient les semences et qui est bien distincte du Calice comme dans la linaire et le muffle de veau, aulieu que dans les fleurs en gueule le pistille se change en un fruit Composé de 4 semences unies et qui meurissent renfermées dans le fond du Calice comme dans une Capsule propre

Les fleurs polypetales se subdivisent aussi en regulieres et irregulieres. ce qui a été dit cy dessus par rapport aux fleurs regulieres et aux irregulieres doit egalement s'appliquer aux fleurs polypetales comme on l'a applique aux fleurs monopetales.

La Subdivision des fleurs polypetales regulieres Contient 4 Classes où les fleurs tirent leur denomination

de la ressemblance quelles ont avec differents objets.
la premiere Classe est celle des fleurs en Croix la 2.de
celle des fleurs en rose, La 3.e celle des fleurs en oeillet
La 4.e est celle des fleurs en Lys.

La fleur en Croix flos Cruciformis est formée
de 4 petales disposés en maniere de Croix telles
sont les fleurs du Cochlearia, de la moutarde, du
gerofflier, de la julienne.

La fleur en rose flos rosaceus est formée par
un arrangement des petales autour des étamines
semblable à l'arrangement des petales de la rose
soit que ces petales excedent ou n'excedent pas le
nombre de 4, soit même quils n'aillent qu'à trois
telles sont les fleurs des roses, celles des renoncules,
de la Pivoine et de la tormentille

il y a encore une classe particuliere de fleurs
en rose c'est celle qui renferme les fleurs des plantes
en ombelle ou en parasol: plantes que l'on nomme
ainsi parceque leurs fleurs ramassées par petits
paquets se trouvent portées sur des pedicules
qui semblent former un parasol. ces fleurs sont
formées de 5. petales portés sur un Calice qui se
change en un fruit composé de 2 semences appli
quée l'une contre l'autre comme dans le Cerfeuil
L'angelique, la Ciguë et toutes celles qui sont
comprises dans cette sorte de classe.

La fleur en oillet flos Caryophylleus est une
fleur qui ne differe de la fleur en rose qu'en
ce que les petales semblent s'élever du fond du

Calice comme du fond d'un tube telles sont les fleurs de l'oeillet, du lychnis et des autres.

La derniere classe des fleurs polypetales regulieres est celle des fleurs qu'on nomme fleurs en lys _flores liliacei_. ces fleurs sont pour l'ordinaire formées de 6 petales, quelque fois de 3 ou quelque fois même d'un seul petale; mais constament decoupé en six parties telles sont les fleurs de la Tulipe, de l'asphodele du lys qui sont formées de six petales. les fleurs de l'Ephemere qui ne sont composées que de 3 petales et les fleurs de la jacinthe qui sont composées d'un seul petale decoupé en six parties regulieres. cette classe a d'ailleurs un caractere propre qui le distingue, c'est que le pistille se change toujours en une capsule a 3 loges.

La subdivision des fleurs polypetales irregulieres ne contient qu'une classe a laquelle on ait donné un nom particulier c'est la classe des fleurs qu'on nomme fleurs legumineuses ou papilionacées _flores leguminosi_ _flores papilionacei_. ces fleurs sont composées de petales irreguliers. on nomme le petale superieur l'etendart. _Vexillum_ le petale inferieur la nacelle _Carina_ quelque fois ce petale est formé de deux pieces. on nomme les parties laterales les aîles ou les rames _alæ_ telles sont les fleurs de feve, de gesse, de pois, d'aricots. d'ailleurs cette classe a pour caractere propre que le pistille se change en un fruit qu'on nomme une silique

On ne rapporte a aucune autre classe particuliere toutes les autres fleurs polypetales irregulieres telles que celles de l'aconit, du pied d'allouette et de la capucine.

la derniere Subdivision des fleurs a petales est celle qui les distingue en fleurs a petales simples et en fleurs a petales composées. les fleurs a petales simples sont toutes celles qui se trouvent comprises tant dans les classes des fleurs monopetales que dans celles des fleurs polypetales regulieres et irre=gulieres. ainsi il ne ~~reste~~ reste plus qu'a examiner les fleurs composées. cette derniere Subdivision renferme 3 classes. qui sont les fleurs composées regulieres ou fleurs a fleurons, les fleurs composées irregulieres ou fleurs a demi fleurons, et les fleurs composées parties regulieres et partie irregulieres ou fleurs radiées.

On nomme fleur composée reguliere ou fleur a fleurons flos flosculosus une fleur composée de petites fleurs ou fleurons tous rapprochés les uns des autres et renfermés dans un même calice. chaque fleuron flosculus est une petite fleur monopetale reguliere dont la partie inferieure est en forme de tüiau et la partie superieure est pour l'ord.re en forme d'etoile. tous ces fleurons portent sur des embryons qui deviennent autant de semences enfermées dans un même calice au fond du quel elles sont adherentes comme a une espece de placenta. on nomme cette espece de placenta

le lit ou la couche *Thalamus* telles sont les fleurs de la jacée, de la Santoline, et du chardon.

Les fleurs Composées irregulieres ou les fleurs a demi fleurons *flores Semiflosculosi* sont des fleurs Composées de demi fleurons tous rapprochés les uns des autres et renfermés dans un même calice. les demi fleurons *Semiflosculi* sont de petites fleurs monopetales irregulieres dont la partie inferieure est en forme de tüiau et la partie Superieure en forme de lâniere ou de languette en latin *lingula* ou *Barbula*. au reste tous ces demi fleurons portent sur des embryons ou petits fruits qui deviennent autant de semences enfermées dans un Calice Commun au fond du quel elles adherent comme a une espece de pla=centa on nomme ce fond le lit *Thalamus*. telles sont les fleurs du Pisenlit, de la laituë, de la chicorée. &c.

Enfin les fleurs Composées partie regulieres et partie irregulieres se nomment fleurs radiées *flores radiati*. elles sont formées de fleurons et demi fleurons rapprochés les uns des autres et enfermés dans un meme Calice. les fleurons occupent le Centre quon nomme le Disc *Discus* et les demi fleurons occupent la Circonference quon nomme la Couronne *Corona*. les fleurons et les demi fleurons portent tous sur des Embryons ou petits fruits qui deviennent autant de semences renfermées dans un Calice Commun au fond

auquel elles adherent comme a une espece de placenta. on nomme ce fond ou ce placenta le lit *Thalamus* telles sont les fleurs des Asters des Jacobées, de la Camomille. &c.

fin

Cours de Botanique Pour l'année 1762

H. R. P.

6

Premiere Leçon

Crocus sativus. Caspari Bauhini
Bermudiana Iridis folio fibrosa radice
institutionum rei herbariæ.
B. gramineo folio flore minore Cœruleo horti Elthamensis.
B. Palmæ folio radice Bulbosa
B. Cyclaminis radice pullo flore
Iris biflora flore minore odore lilii convallium C. B.
J. Palustris lutea Tabernæ
J. Vulgaris germanica sive Sylvestris
J. Latifolia germanica odore Sambuci
J. latifolia Pannonica Colore multiplici.
J. Latifolia germanica ochroleucos C. B.
J. Dalmatica major C. B.
J. hortensis pallide Cœrulea C. B.
J. hortensis latifolia.
J. alba florentina
J. Lutea variegata
J. media foliis longissimis lutea
J. latifolia minor alba oris Cœruleis Emmanuelis Suvertii
J. Canadensis angustifolia Cœrulea.
J. angustifolia maritima minor C. B.
J. angustifolia prunum redolens minor
J. Pratensis angustifolia non foetida altior.
J. angustifolia prunum redolens major
J. Susiana flore maximo ex albo nigricante C. B.
J. foetidissima seu Xyris
J. humilis Saxatilis gallica

Hermodactylus folio quadrangulo C. inst.

x Antholyza stamine unico declinato. Linnaei Specie=
=rum

x A. Corollarum alis patulis labio inferiore minore. Lim.

Xyphion praecox flore variegato institutionum

X. latifolium caule donatum flore coeruleo. inst.

X. angustifolium flore vario

Ixia foliis ensi formibus floribus remotis. Lin. h. Clif.

Gladiolus utrinque floridus. C. B.

G. major Bisantinus

G. africanus folio gramineo floribus carneis macula rhomb=
=oideâ purpureâ inscriptis uno versu positis

Colchicum commune. C. B.

Asphodelus foliis compresis

A. albus ramosus minor seu mas alter. h. R. P.

x A. albus mas. C. B.

A. luteus flore et radice

A. foliis fistulosis

A. Zeylanicus foliis rotundis cepaceis floribus luteis horti Pisani

A. africanus angustifolius luteus minor. institutionum

A. africanus luteus foliis aloes horti Pisani.

A. foliis cepaceis angustioribus floribus luteis spicatis foetidis

A. foliis planis caule ramoso floribus sparsis. Millerii

Phalangium alpinum palustre iridis folio. institutionum

P. parvo flore non ramosum

P. ramosum Dodonea

Scylla vulgaris radice rubrâ

Ephemerum virginianum flore albo minori

E. virginianum flore purpureo majori

Narcissus junci folius luteus minor. C. B.
× N. junci folius oblongo Calice luteus major
N. albus Circulo purpureo. C. B.
N. albus Circulo croceo polyanthos
N. albus magno odoro, flore circulo pallido. C. B.
N. maritimus. C. B.
N. vernus americanus flore albo. just.
N. jllyricus liliaceus. C. B.
N. americanus flore multiplici albo, odore balsami Peruviani juritationum.

Ornithogalum umbellatum album medium latifolium. C. B.
O. Coeruleum lusitanicum latifolium. just.
O. Spicatum album.
× O. angusti folium majus floribus ex albo virescentibus
O. Spicatum flore viridi lactescente.
× O. luteo virens indicum. Cornuti.
O. autumnale minus flore dilute purpureo
×

Muscari arvense latifolium purpurascens. just.
M. Uva ramosa majus. just.
M. arvense junci folium coeruleum minus.
M. obsoletiore flore. clusii.

hyacinthus oblongo flore coeruleus major
h. obsoleto flore. C. B.
h. orientalis maximus. C. B.
h. orchioides africanus major bifolius maculatus flore sulphureo obsoleto majore. Breyni
h. judicus tuberosus flore hyacinthi orientalis
h. africanus tuberosus flore coeruleo umbellato h. Amstelodami

Lilio hyacinthus vulgaris flore coeruleo. just.
L. album vulgare. J. B.
L. purpureo croceum majus. C. B.
L. floribus reflexis montanum flore suave rubente
L. Bisantinum miniatum. C. B.
L. brevi et graminco folio.
L. narcissus indicus saturato colore purpurascens. Moris.
L. narcissus jacobæus latifolius indicus rubro flore. moriss.
L. narcissus jacobæus indicus pumilus monanthos albus
L. narcissus polyanthos flore incarnato, fundo ex luteo —
albescente. Domini Sloanes.
Liliastrum alpinum minus. just.
Lilio asphodelus luteus minor. just.
L. asphodelus phoeniceus. Parkinsonii
L. asphodelus americanus semper virens minor
L. asphodelus americanus semper virens maximus polyanthos
albus. Commelini
Aphillantes monspeliensium. Lobelii
hypoxis pilosa capsulis ovatis. linnæi
Narcisso leucoium pratense multiflorum. just.
Wachendorfia paniculata. Burmanni
Commelina procumbens flore luteo
C. erecta ampliore sub coeruleo flore h. Elthamensis
C. radice anacampserotis. Dill. h. Elth.
Allium latifolium luteum just.
A. angustifolium umbellatum flore albo. just.
A. sphæriceo capite folio latiore sive scorodoprasum
alterum. C. B.
A. sativum. C. B.

A. latifolium liliflorum flore subrubente

× A. latifolium liliflorum. C. B.

A. quod Caucaphon moli indicum vocatum. Lobelii

A. montanum Latifolium minus. Montis aurei. h.R.P.

A. montanum folio Narcissi minus

A. montanum folio Narcissi majus. C. B.

× A. Caule triangulo. just.

A. Sylvestre bicorne flore ex herbaceo albicante cum triplici in singulis petalis stria atro purpurea Raji

A. Sylvestre latifolium. C. B.

Porrum commune capitatum

Cepa vulgaris floribus et tunicis candidis

C. fisilis. Matthioli

C. ascalonica. Matthioli

C. junci folia minor purpurascens

C. Lusitanica foliis capillaceis minima purpurascente flore. jussitationum

C. Sectilis junci folia perennis

Tulipa praecox lutea

Fritillaria praecox purpurea variegata. C. B.

× F. maxima flore obsolete purpura

Corona Imperialis Dodonea

× Corona Regalis lilii folio crenato. Dill. horti Elthamensis

Haemanthus africanus. Hermanni.

H. colchici foliis perianthio herbaceo. Dillenii. horti Elthamensis. ×

Seconde Leçon

= Orchis barbata fœtida. J. B.
× O. odore hirci minor. C. B.
O. morio fœmina procerior majori flore. inst.
O. Palmata montana maculata. C. B.
O. Palmata pratensis latifolia longis calcaribus. C. B.
× O. Palmata minor calcaribus oblongis. C. B.
× O. Spiralis alba odorata J. B.
× O. Spiralis alba odorata longo angustoque folio. D. Vaillant
Ophris bifolia. C. B.
Nidus avis. Lugduni historiæ.
× Calceolus mariæ luteus. Morissonii
C. marianus Canadensis. Cornuti
Helleborine angusti folia palustris sive Pratensis. C. B.
H. latifolia montana. C. B.
H. Purpurea tuberosa radice. Plumerii
H. ramosissima cauliculis et floribus maculosis. Plum.
Limonium foliis halimi. Brossæi.
L. Peregrinum foliis asplenii. C. B.
L. parvum bellidis minoris folio. C. B.
L. maritimum majus. C. B.
L. lusitanicum auriculæ Ursi folio. inst.
L. maritimum minimum. C. B.
L. hispanicum multifido folio. institutionum
Fraxinella. clusii
Pyrola rotundi folia major. C. B.
Soldanella alpina rotundi folia. C. B.
Veratrum flore atro rubente. inst.
V. flore subviridi. institutionum

Helleborus fumariæ foliis. Ammanni
h. niger ranunculi folio flore globoso majore. Just.
h. niger flore roseo. C. B.
h. niger amplioribus foliis. Just.
h. niger hortensis flore viridi. C. B.
h. niger fetidus. C. B
h niger trifolius. morissonii
Populago flore majore Just.
Sedum quod poligonum muscosum minimum Bocc.
S. majus arborescens. J. B.
S. Canarinum foliis omnium maximis. C. B.
S. montanum tomentosum. C. B.
S. majus vulgare. C. B.
S. Vulgari magno simile. J. B.
S. minus folio cirinato. C. B.
S. Cepæa dictum. Hermanni. horti lugduni Batavorum
S. arvense flore rubente. C. B.
S. longi folium Citrino flore. Morissonii
S. minus luteum, ramulis reflexis
S. minus lato et Crasso Caule. Portlandicum Belgarum
horti Regii Parisiensis
S. minus luteum folio acuto. C. B.
S. minus tereti folium album. C. B.
S. parvum acre flore luteo. J. B.
S. Echinatum vel Stellatum flore albo. J. B.
Anacampseros purpurea. J. B.
A. Vulgo faba Crassa. J. B.
A. Portulacæ folio. Just.
A. maxima. J. B

A. Lusitanica haemathodes maxima just.
A. flore flavo. Ammanni
A. radice rosam spirante major. just.
A. minor rotundiore folio semper virens. J. B.
A. minor longiore folio semper virens. just.
Paeonia foemina flore pleno rubro majore. C. B.
P. aquilina foliis. C. B.
P. communis vel foemina. C. B.
P. tenuis laciniata subtus pubescens flore purpureo
P. foemina altera. C. B.
P. ochranthemos. Camerarii.
P. folio nigricante splendido quae mas. C. B.
Melianthus africanus. hermanni
M. americanus minor. Just.
Moschatellina foliis fumariae bulbosae de quâ
Codrus. Joannis Bauhini
Parnassia palustris et vulgaris Just.
herba Paris. Dodonaei
Anemone hortensis tenui folia simplici flore. Clusii
A. sylvestris alba major. C. B.
A. virginiana. Paradisi Batavi
A. Canadensis latifolia erecta flore albo.
Pulsatilla folio crassiore et majore flore. C. B.
Myosuros. J. B.
Ranunculus tripolitanus vel asiaticus flore pleno
varii coloris.
R. tridentatus vernus flore simplici coeruleo. Just.
R. vernus rotundi folius minor. just.
R. pratensis radice verticilli modo rotunda. C. B.

R. montanus folio gramineo. C. B.
R. Phragmites purpureus vernus. J. B.
" R. nemorosus trifolius. h. L. B.
R. arvensis annuus hirsutus flore omnium minimo luteo Morisonii
× R. Asphodeli radice creticus. C. B.
R. nemorosus, vel Sylvaticus virginianus flore parvo molliori folio. hermanni. h. L. B.
R. Cyclaminis folio asphodeli radice major. inst. R.
R. Polyanthemos simplex. Lobelii
R. Pratensis repens et hirsutus. C. B.
R. longi folius palustris major. C B.
R. longi folius palustris minor
R. Palustris apii folio Levis. C. B.
R. canadensis tenui folius hirsutissimus flore luteo parvo
R. montanus aconiti folio albus flore majore. C. B.
R. montanus aconiti folio albo flore minore. C. B
R. Lanuginosus angusti folius grumosa radice major. C.B.
R. montanus subhirsutus geranii folio. C. B.
R. Cherophyllos asphodeli radice. C. B.
R. pratensis erectus acris
R. alpinus humilis rotundi folius, flore majore. C. B.
× R. foeniculaceis foliis hellebori nigri radice. Magnolii
R. arvensis foliis chamameli flore minore atro rubente institutionum
R. Palustris echinatus. C. B.
× R. aquaticus folio rotundo et Capillaceo. C. B.
R. arvensis echinatus. C. B.
R. aquaticus capillaceus. C. B.

Troisieme Leçon

Spermacoce verticillis globosis. h. Elthamensis

Aparine vulgaris. C. B.

A. latifolia humilior montana just.

A. palustris minor parisiensis flore albo. just.

A. minima botanicæ Monspeliensis

A. Semine Coriandri Saccharati. just.

A. Supina pumila flore Cæruleo. just.

Rubia tinctorum sativa. C. B.

R. Sylvestris monspessulana major. J. B.

Anthospermum Linnæi

Rubeola angustiori folio. just.

R. Latiore folio. just.

R. vulgaris quadrifolia levis floribus purpurascentibus. just.

R. maritima just.

Gallium luteum. C. B.

G. album vulgare just.

G. Saxatile Supinum molliore folio. D. Jussieu

G. flore pallido. J. B.

G. Saxatile glauco folio.

G folijs linearibus Sulcatis retrorsum Scabris pedicallis capillaribus flore. e gallo Provincialis. D. Gerard.

Cruciata orientalis latifolia erecta glabra. just.

C. alpina tenui folia levis. just.

C. minor glabra flore mollugini albo. Barlerii.

C. alpina latifolia levis. just.

C. hirsuta. C. B.

C. orientalis glabra humifusa just.

C. muralis minima romana. fabii Columnæ.

C. tomentosa flosculis luteis in corniculis longis hispidis Boerhaave.

Simpla nobla canariensium. Pluknetii.

Samolus valerandi. J. B.

Glaux maritima. C. B.

× G. Palustris flore striato clauso foliis Portulacæ. C. B.

Salicaria hyssopi folio latiore just.

S. erecta caule rubente foliis longis angustis.

S. vulgaris purpurea foliis oblongis just.

S. purpurea foliis subrotundis. just.

Lysimachia lutea major quæ Dioscoridis C. B.

L. floridana lutea minor chamænerii binatis foliis nigris punctis notatis floribus parvis in spicam digestis Pluknetii.

L. bifolia flore globoso luteo. C. B.

L. orientalis angusti folia flore purpureo. Cor. just.

L. spicata flore albo salicis folio just.

L. hispanica spicata salicis folio flore purpurascente

L. humifusa folio subrotundo acuminato flore luteo. just.

L. humifusa folio rotundiore flore luteo just.

L. annua minima polygoni folio. just.

L. Canadensis jalapæ folio. Saraceni.

Onagra bonariensis villosa flore mutabili. h. Ut.

O. latifolia just.

O. angusti folia just.

O. angusti folia fructu monospermo tetragono

O. angustifolia caule rubro flore minore. just.

Turnera frutescens ulmi folia. Plumerii

Chamænerion alpinum alcines folio Scheuxeri

C. angusti folium alpinum flore purpureo. inst.
C. latifolium vulgare. inst.
C. villosum minus parvo flore inst.
C. angusti folium glabrum. inst.
C. alpinum foliis splendentibus denticulatis. inst.
C. villosum magno flore purpureo inst.

Cassida cretica frutiosa cataria folio flore albo. institutionum.
C. orientalis chamædryos folio flore luteo inst.
C. Columnæ.
C. alpina supina magno flore albido. inst.
C. peregrina melissæ folio. inst.
C. americana procerior. inst.
C. palustris vulgatior flore Coeruleo. inst.
C. palustris minima flore purpurascente. inst.

Lavandula angustifolia. C. B.
L. latifolia spica C. B.
L. latifolia indica subcinerea spica breviore. h. R. P.
L. folio dissecto.
L. folio longiori tenuius et elegantius dissecto. inst.

Stæchas folio serrato C. B.
S. purpurea

Molucca spinosa
M. levis Dodonei

Satureia sativa J. B.
S. americana caule lignoso foliis dentatis angustis.
S. floribus in summitate dispositis. h. lug. B.

Hyssopus officinarum coerulea sive spicata C. B.
H. flore inverso. Linnæi.

Leonurus Capitis bonæ Spei. Breynii
× L. minor Capitis bonæ Spei vulgo. Boerhavve
L. annuus africanus nepetæ folio flore albo minore.
Rosmarinus hortensis angustiore folio. C.B.
Monarda Capitulis terminatricibus Caule obtuse angulato. Linnæi horti Clifortiani
M. Caule acuté angulato Capitulis que terminatricibus. h. Clif.
M. floribus verticillatis. Linn. h. Clif.
Chamæpytis lutea vulgaris sive folio trifido C.B.
× C. moscata foliis serratis. C.B.
Thymbra Sancti juliani sive Satureia vera Lob.
T. spicata verior hispanica Barlerii.
T. Legitima Clusii.
T. hispanica majoranæ folio. just.
Thymus Capitatus qui dioscoridis. C.B.
T. Citri odore
T. vulgaris folio tenuiore. C.B.
T. vulgaris folio latiore. C.B.
Serpillum vulgare majus. C.B.
S. latifolium hirsutum. C.B.
S. folio Thymi. C.B.
Rhuyschiana flore Cœruleo magno. Boerh.
R. folio angusto dentato.
Polium montanum luteum. C.B.
P. montanum album
P. Pyrenaicum supinum hederæterestris folio just.
P. Candidum tenellum tomentosum flore purpureo J.B.
P. Lavandulæ folio. C.B.
Chamædrys laciniatis foliis. Lobelii

C. fruticosa cretica purpureo flore. just.
C. frutescens teucrium vulgo. just.
C. fruticosa sylvestris melissæ folio just.
C. fruticosa insularum stæchadum melissæ folio minori pomum redolens. just.
C. herbacea Canadensis melissæ folio longiori
C. lucida alpina. h. R. P.
C. major repens. C. B.
C. Multiflora tenui folia hispanica. just.
C. maritima incana frutescens foliis lanceolatis just.
C. foliis cordatis, crenatis, spicis oblongis densissimis.
C. palustris canescens seu scordium officinarum just.
C. fruticosa lusitanica melissæ folio minori, flore purpureo institutionum
Ocimum zelanicum perenne frutescens folio — calamenthæ non nihil simili. Paradisi. Bat.
O. caule subfructicoso foliis ovatis racemis tenuibus. linn.
O. foliis sublanceolatis acuminatis serratis, racemis rotundis, caule subherbaceo. Linnæi.
O. majus bullatum. Barlerii.
O. foliis fimbriatis viridibus. C. B.
O. majus vulgare. Barlerii.
O. minimum. C. B.

Quatrieme Leçon

Teucrium hispanicum latiore folio. just.
T. Bæticum. clusii historiæ. just.
T. rorismarini folio et facie Egyptiacum. D. Granger.
T. supinum perenne foliis laciniatis. just.
T. hispanicum supinum verbenæ tenui foliæ foliis. D. Gosson

T. Spinosum Linnæi Specierum

Verbena communis Cœruleo flore. C. B.

V. americana altissima Urticæ foliis angustioribus Spicis brevioribus floribus Coeruleis. Boerh.

V. americana Spicâ multiplici foliis Urticæ angustissimis floribus Coeruleis. P. P. B.

V. Bonariensis altissima lavandulæ Canariensis flore Spica multiplici. Dill. h. Elthamensis.

V. tenui folia. C. B.

V. Urticæ folia Canadensis. h. R. P.

× V. orubica teucrii folio primulæveris flore Siliqua et Seminibus longissimis. L. B.

× V. erecta divisa Spicis e divaricationibus Supremis assurgentibus. Brour.

V. maxima Trachelii folio frutice apparines Dill. h. El.

V. nodi flora. C. B.

× V. nodi flora frutescens Salviæ folio americana

V. americana Spicis longis Carnosis foliis lanceolato ovatis dentatis.

× V. judica. Bontii.

Origanum Creticum tomentosum latifolium Seu Dictamnus Creticus. Inst.

O. vulgare Spontaneum. J. B.

O. Sylvestre humile. C. B.

Majorana vulgaris. C. B.

M. rotundi folia Scutellata exotica. h. R. P.

M. cretica origani folio villosa Satureiæ odore corymbis majoribus albis Corollarii Inst.

Clinopodium arvense ocimi facie. C. B.

C. perenne pulegii odore majoranæ folio. Boccone
C. menthæ folio incanum et odoratum Pil. h. Elth.
C. origano simile. C. B.
C. alpinum roseum satureiæ foliis Boccone
C. orientale hirsutum foliis inferioribus ocimum superioribus hyssopum referentibus.

X **Cataria** americana altissima flore minore
C. pannonica major et elatior.
C. minor alpina. Inst.
C. orientalis teucrii folio lavandulæ odore verticillis florum crassissimis. Cor. Inst.
C. major vulgaris. Inst.
C. Canadensis altissima scrophulariæ folio caule purpurascente
C. Canadensis altissima scrophulariæ folio caule virescente
C. foliis sessilibus verticillis nudis
2 C. hispanica betonicæ folio angustiori flore albo. Ins.
1 C. hispanica betonicæ folio angustiori flore purpurascente
* C. Lusitanica erecta betonicæ folio tuberosa radice. Inst.
C. hispanica supina betonicæ folio tuberosa radice Inst.
* C. floribus spicatis ex foliorum alis.
C. montana foliis veronicæ pratensis Burmanni

Calamintha humilior folio rotundiore Inst.
C. incana ocimi folio. C. B.
C. vulgaris exiguo flore. C. B.
C. vulgaris et officinarum germaniæ. C. B.
C. magno flore. C. B.
C. pulegii odore sive nepeta. C. B.

C. frutescens Satureiæ folio facie et odore just.
C. cretica angusto, oblongo folio just.
Mentha aquatica Satureiæ folio. just.
M. aquatica seu pulegium vulgare just.
M. sylvestris longiore folio. C. B.
M. Egyptiaca seu niliaca incana spicis brevioribus —
angustifolia
M. sylvestris rotundiore folio Caspari Bauhini.
M. hortensis verticillata ocimi odore. C. B.
M. rotundifolia spicata altera. C. B.
M. crispa Danica aut Germanica speciosa Plukneti.
M. spicis brevioribus et habitioribus foliis menthæ fuscæ
sapore fervido piperis. Raji synopsis
x M. angustifolia magis serrata Boerh.
M. arvensis verticillata hirsuta. J. B.
M. rotundifolia palustris seu aquatica major. C. B.
M. floribus capitatis ex alis foliis ovatis crenatis —
caule arborescente. Linn. h. Clif.
Galeopsis procerior fetida spicata just.
G. patula segetum flore purpurascente. just.
G. annua hispanica rotundiore folio. just.
G. sive urtica iners flore luteo. J. B.
G. palustris betonicæ folio flore variegato. just.
G. procerior caliculis aculeatis flore purpurascente just.
G. hispanica frutescens teucrii folio. just.
Lamium orientale nunc moscatum nunc —
fetidum magno flore. Cor. just.
L. purpureum non fetens folio oblongo. just. C. B.
L. maximum sylvaticum alterum. C. B.

L. folio Caulem ambiente minus. C. B.
L. vulgare album sive archangelica flore albo. Park.
L. jtalicum maximum flore amplo purpureo. act. a. R. P.
L. Parietariæ folio. morisonii
Cardiaca. j. B.
C. Tartarica foliis tenuissime divisis
C. Crispa Raji hist.
Amethystea. Linn. h. Upsaliensis
Lycopus Canadensis glaber foliis incisis. inst.
L. palustris glaber. inst.
Ballote matthioli.
B. inodora foliis Coronopi. Ammanni.
B. foliis geranii Batrachioides. Ammanni.
Marrubium album latifolium peregrinum C. B.
M. album vulgare. C. B.
M. hispanicum supinum calice stellato et aculeato. inst
M. album angustifolium peregrinum. C. B.
Pseudodictamnus hispanicus crispus et rugosus. inst.
P. verticillatus inodorus
P. hispanicus Scrophulariæ folio. inst.
P. hispanicus amplissimo folio nigricante et villoso. inst.
Alsinoides annua verna. Vaillant. Bot. Paris.
Plantaginella aquatica vulgaris
Rossolis folio oblongo rotundo. C. B.
Arapabaca perennis caule folioso flore magno. Plukn.
Coris cærulea maritima. C. B.
Pedicularis serotina purpurascente flore. inst.
P. pratensis lutea, vel crista galli. C. B.

P. palustris rubra elatior. Raji Synopis.

Acanthus aculeatus. C. B.

A. rarioribus et brevioribus aculeis munitus instit.

A. sativus vel mollis. vergilii. C. B.

A. Lusitanicus amplissimo folio non spinoso

Capraria curassavica Cabritta vulgo dicta. Commelini

Scoparia Linn. novorum generum

Bodartia orientalis flore purpurascente Cor. inst.

Martynia foliis serratis. Linn. h. Cliffortiani

Browallia. Linnæi. h. clif.

Melampyrum purpurascente comâ. C. B.

M. luteum latifolium. C. B.

Pinguicula. Gesneri. C. B.

Ageratum serratum alpinum. C. B.

A. serratum Pyrenaicum villosum flore purpurascente C. B.

Scrophularia aquatica major C. B.

S. nodosa fetida. C. B.

S. betonicæ folio. inst.

S. laserpitii foliis. Boccone

S. melissæ folio. inst.

S. folio urticæ. C. B.

S. orientalis foliis Cannabinis. Corollarii institutionum

S. hispanica Sambuci folio glabro. inst.

S. flore luteo. C. B.

Orobanche major Caryophyllum olens. C. B.

Barleria spinis axillaribus quaternis foliis integerrimis. Linn. Specierum.

B. Solani folio flore coccineo. Plumerii.

Ruellia humilis flore cœruleo asphodeli radice. Plum.

R. strepens capitulis comosis Dillennii horti Elth.

Cinquieme Leçon

Sideritis hirsuta procumbens. C. B.
S. montana trifido folio. Barterii
S. orientalis phlomidis folio. Cor. Inst.
S. Persica odorata. Zanoni
S. hispanica crenata procumbens flore albo major. Inst
S. alpina hyssopi folia C. B.
S. cretica tomentosa candidissima flore luteo. Cor. Inst.
S. incana oleæ folio. Bocc.
S. foliis hirsutis profunde crenatis. C. B.
S. hispanica fetidissima glabra flore purpurascente et coma canescente. Inst.

Marrubiastrum sideritidis folio caliculis aculeatis flore candicante. Inst.
M. sideritidis folio caliculis aculeatis flore flavo cum limbo atro purpureo. Inst.
M. vulgare. Inst.
M. cardiacæ folio Bocc.

2.e Moldavica betonicæ folio floribus minimis pallido cæruleis. Ammanni.
1.re M. betonicæ folio floribus minoribus cæruleis pendulis. Am.
M. orientalis saliuis folio flore parvo cæruleo. Cor. Inst.
M. orientalis betonicæ folio flore magno violaceo. Inst.
M. betonicæ folio flore cæruleo. Inst.
M. americana trifolia odore gravi. Inst.

Melissa atro rubens bugulæ folio. h. Elth.
M. hortensis. C. B.
M. romana molliter hirsuta et grave olens. h. R. P.

M. humilis latifolia maximo flore purpurascente. Just.
M. americana altissima foliis subrotundis glabris
M. Pyrenaica caule brevi plantaginis folio. Just.
M. altissima globularia. Plumerii.
Betonica orientalis angustissimo et longissimo
folio spica florum crassiori. Cor. Just.
B. major Danica. Park.
B. Purpurea. C. B.
B. arvensis annua flore ex albo flavescente. Just.
B. alpina latifolia major villosa. h. R. P.
Bugula. Dodonei
B. sylvestris villosa flore coeruleo Just.
B. orientalis villosa flore inverso coeruleo alba macula
notato. Cor. Just.
Brunella boetica annua foliis laciniatis Pluk.
B. verbenulæ foliis flore purpurascente. D. Vaillant.
B. major folio non disecto. C. B.
B. folio laciniato flore albo. h. R. P.
B. hyssopi folia. C. B.
Colinsonia. Linn. h. clif.
Dracocephalum americanum. Breynii.
Stachys orientalis altissima fetida. Cor. Just.
S. qua Pseudostachys alpina
S. cretica latifolia major
S. major germanica. C. B.
S. minor italica. C. B.
S. orientalis salviæ folio flore variegato.
S. orientalis salviæ folio angustiori flore purpurascente
variegato.

S. canariensis frutescens verbasci folio. just.
S. canariensis frutescens verbasci folio incano
Salvia baccifera. C. B.
S. major calice floris purpurascente. Scholæ Botanicæ
S. major an Sphacelus Theophrasti.
S. hispanica flore albo. Barlerii.
S. latifolia serrata. C. B.
S. altera perelegans tricolor argentea belgarum. h. R. P.
S. major foliis ex luteo et viridi variegatis. h. R. P.
S. angustifolia serrata. C. B.
S. minor aurita et non aurita.
S. foliis cordatis, serratis, flore parvo violaceo et albo.
S. folio tenuiore. C. B.
S. orientalis foliis alatis majoribus et serratis. Cor. just.
S. orientalis latifolia hirsutissima, viscosa, pinnata
flore et calice purpureis inodora. Boerh.
S. montana maxima foliis hormini flore flavescente. just.
S. africana frutescens folio subrotundo glauco flore magno
aureo. Commelini.
S. africana frutescens scorodoniæ foliis flore violaceo
Commelini.
Sclarea folio triangulari ~~flore~~ caule tomentoso. just.
S. syriaca flore coeruleo. just.
S. indica flore variegato. just.
S. quæ horminum minus Betonicæ folio flore purpureo
S. mexicana altissima facie heliotropii. h. Elth.
S. Tabernæ montanæ.
S. rugoso, verrucoso et laciniato folio. just.
S. Egyptiaca frutescens fetidissima hirsuta flore albo.

S. africana praecox annua. Just.
S. Tingitana fetidissima hirsuta flore albo. Just.
S. orientalis verbasci folio flore partim albo, partim flavescente. Cor. Just.
S. asphodeli radice. Just.
S. Pratensis foliis serratis flore suave rubente Just.
S. Pratensis foliis serratis flore Coeruleo Just.
S. orientalis betonicae folio
S. orientalis betonicae folio acutiori, Coma purpurascente Cor. Just.
S. laciniatis foliis. Just.

Horminum napi folio. Morinonii.
H. Sylvestre latifolium verticillatum. C. B.
H. Sylvestre majus flore albo, integris foliis. Barlerii
H. Sativum. C. B.
H. Coma purpureo violacea. J. B.
H. Sylvestre lavandulae flore. C. B.
H. Pratense flore minimo Scholae Botanicae
H. folio subrotundo serrato flore Coeruleo.
H. hispanicum urticae folio flore parvo Coeruleo.
H. foliis Cordatis, inaequaliter basi excisis Spica florum incurva

Phlomis Cretica fruticosa folio subrotundo flore luteo. Cor. Just.
P. hormini folio floribus parvis suave rubentibus villosissimis annuanni.
P. Narbonensis hormini folio flore purpurascente
P. orientalis hormini folio subtus incano flore purpurascente
P. fruticosa Salviae folio longiore et angustiore Just.
P. latifolia Capitata lutea grandiflora. h. Elth.

P. fruticosa Salviæ folio latiore et rotundiore. Just.
P. hispanica fruticosa Candidissima flore ferrugineo. Just.
P. Lychnitis. Clusii.
P. orientalis foliis laciniatis. Cor. Just.

Centaurium minus. C. B.
C. luteum perfoliatum. C. B.

Gentiana asclepiadis folio. C. B.
G. alpina magno flore. J. B.
G. alpina pumila verna major
G. cruciata. C. B.
G. major lutea. C. B.

Primulaveris rubro flore. Clusii
P. odorata flore luteo simplici. J. B.
P. pallido flore humilis. Clusii

Auricula ursi flore luteo. J. B.
A. alpina angustifolia. Just.
A. alpina gramineo folio jasmini lutei flore. Just.

Androsace alpina perennis angustifolia glabra et multiflora. Just.
A. vulgaris latifolia annua. Annu. Just.
A. Coronopi foliis glabra, flosculis ex verticilli foliosi umbilico pluribus albis. Annu.

Sixieme Leçon

Verbascum nigrum ex luteo purpurascente folio papaveris Corniculati
V. ramosum Perenne Just.
V. mas latifolium luteum
V. fœmina flore albo. C. B.
V. Pulverulentum flore luteo parvo. J. B.

V. Lychnitis flore albo parvo. C. B.
V. humile alpinum villosum boriaginis flore et folio. just.
V. nigrum Dodonei
V. foliis subrotundis flore blattariæ. C. B.
V. orientale sophiæ folio. Cor. just.

Blattaria pilosa cretica sive arcturus quorum=
=dam J. B.
B. alba. C. B.
B. lutea. J. B.
B. hispanica odorata agrimoniæ foliis.
B. orientalis folio verbasci flore luteo Egyptiaca D. Granger.
B. flore nigræ violæ colore eleganti nitente. C. B.

Adhatoda h. Lug. Bat.
A. indica folio saligno flore albo. Boerh.
A. floris labio superiori angustissimo et ad posteriora reclinato. just.
A. foliis ovatis, caule angulato, flore parvo coeruleo.

Chelone floribus dilute purpureis flore virginica
C. foliis sessilibus acuminatis.

Mimulus. Linnæi h. Upsaliensis

Sesamum. J. B.

Digitalis minima gratiola dicta. Morisonii
D. acanthoides canariensis frutescens flore aureo. C. B.
D. hispanica purpurea minor. just.
D. hispanica minor villosa et incana flore albo
D. purpurea. J. B.
D. major lutea vel pallida parvo flore. C. B.
D. lutea magno flore. C. B.
D. angustifolia flore ferrugineo purpurascente. C. B.

B. media flore luteo rubente. Parkinsonii.
B. angustifolia flore ferrugineo. C. B.
B. latifolia flore ferrugineo B. Vaillant

Bignonia americana arbor Syringæ cæruleæ folio flore purpureo. Milleri Catalogi

B. arborescens folio singulari undulato siliquis longissimis et angustissimis. Plum.
B. americana capreolis aduncis donata siliqua longissima Just.
B. americana capreolis donata siliqua breviori Just.
B. arbor flore luteo fraxini folio. Plum.
B. americana scandens minor fraxini folio
B. africana arborescens fraxini folio latiore flore amplo phœniceo.
B. americana fraxini folio flore amplo phœniceo. Just.

Helianthemum vulgare flore dilutiore. Just.

H. vulgare flore luteo. J. B.
H. saxatile foliis et caulibus incanis oblongis floribus albis
H. sive cistus humilis folio sampsuchi capitulis valde hirsutis. J. B.
H. flore maculoso. Commelini.
H. Ægyptiacum annuum angustifolium fructu vesicario
H. massiliense coridis folio. Just.
H. tenuifolium glabrum per humum sparsum flore luteo J. B.
H. frutescens folio majoranæ incano. Just.
H. foliis myrti minoris subtus incanis. Just.
H. ledi folio. Just.
H. salicis folio. Just.
H. folio thymi incano. J. B.

h. alimi folio latiore mucronato. Inst.
h. foliis rorismarini splendentibus subtus incanis. Inst.
Cistus ledon foliis populi
C. foemina folio salviæ elatior C. B.
C. foliis laurinis. C. B.
+ C. hirsutum. C. B.
C. ladanifera hispanica salicis folio flore albo macula punicante insignito. Inst.
C. ledon foliis oleæ, sed angustioribus. C. B.
C. ledon foliis rorismarini sed non incanis. C. B.
B C. ladanifera Monspeliensium.
C. mas folio oblongo incano. C. B.
C. mas foliis undulatis et crispis. Inst.
— C. mas major folio rotundiore. J. B.
C. mas secundus folio longiore. J. B.
Hypericum vulgare. C. B.
h. villosum erectum caule rotundo. Inst.
h. ascyrum dictum caule quadrangulo. J. B.
h. fetidum frutescens. Inst.
h. Canariense frutescens multiflorum
x h. crispum triquetro et cuspidato folio. Bocc.
h. minus supinum vel supinum glabrum. C. B.
h. perfoliatum et perforatum. Inst.
// h. elegantissimum non ramosum folio lato. J. B.
h. supinum tomentosum minus vel monspeliacum. Caspari Bauhini.
h. supinum tomentosum majus vel hispanicum. C. B.
h. palustre supinum tomentosum. Inst.
h. Ægyptiacum frutescens Polygoni folio.

Ascyrum balearicum foliis crispis sive Myrto cistus. Clusii

A. magno flore. C. B.

Androsæmum maximum frutescens. C. B.

× Linaria saxatilis serpilli folio. just.

1 L. saxatilis alsines folio villoso just

3 L. annua angustifolia, flosculis albis longius caudatis Trionphetti

× L. Cærulea repens C. B.

2 L. tenuifolia æruginei coloris. C. B.

4 L. Capillaceo folio odora. C. B.

6 L. pumila, supina lutea. C. B.

5 L. valentina. Clusii

L. annua angustifolia flore majore luteo. Morissonii

7 L. pumila vulgatior arvensis. just.

9 L. vulgaris lutea flore majore. C. B.

8 L. purpurea major odorata. C. B.

10 L. sicula multicaulis mollugininis folio. Bocc.

12 L. segetum nummulariæ folio villoso just.

11 L. hederaceo folio glabro seu Cymbalaria vulgaris. just. ×

Asarina Lobelii lug. historiæ

Antirrhinum saxatile villosum folio origani glutinoso. Barrelii

A. hispanicum villosum origani folio just.

A. vulgare

A. majus angustifolium amplo flore purpureo romanum Barrelii

A majus alterum folio longiore flore candido dilute purpurascente. C. B.

A. arvense majus. C. B.

Euphrasia officinarum. C. B.

Linum maritimum luteum. C. B.

L. Perenne majus Cœruleum Capitulo majore. Moriss.

L. Sativum. C. B.

L. Sylvestre Cœruleum folio acuto. C. B.

L. Pratense flosculis exiguis. C. B.

L. arvense. C. B.

L. africanum Sativo Simile folio latiore fructu majore

Geum rotundi folium majus. Just.

G. folio Subrotundo majori pistillo floris rubro. Just.

G. folio Circinato pistillo floris pallido. Just.

G. angustifolium autumnale flore luteo guttato. Just.

Saxifraga muscosa trifido folio. Just.

S. Pyrenaica foliis partim integris partim trifidis. Just.

S. Sedi folio flore albo multiflora. Just.

S. Sedi folio angustiore Serrato. Just.

S. foliis Subrotundis serratis. Just.

S. alba Petræa. Pc

S. alpina ericoides flore Cœruleo. Just.

S. verna annua humilior. Just.

Cortusa americana flore Squalide purpureo Paradisi Batavi.

Mitella americana florum petalis integris. Just.

M. americana florum petalis fimbriatis. Just.

M. americana repens petalis florum fimbriatis

Penthorum flore virginicæ

Septieme Leçon

Campanula Pentagonia perfoliata. Moriss.

C. arvensis erecta h. Lugd. Batavi

C. arvensis erecta Euphrasiæ luteæ folio aut Columnæ.

C. radice esculenta flore Cæruleo. Ammanni.

C. radice esculenta Caulibus et foliis hirsutis

C. maxima foliis latissimis flore Cæruleo et albo. C. B.

C. vulgatior foliis Urticæ vel major et asperior. C. B.

C. media foliis inferioribus candidâ lanugine vestitis C. B.

C. Persicæ folio Clusii.

C. Urticæ foliis, glabra, floribus minoribus Pendulis. Amm.

C. minor annua foliis incisis. Moriss.

C. foliis Echii floribus villosis. C. B.

C. alpina Sphærocephalos. C. B.

C. hortensis rapunculi radice. C. B.

C. Pratensis flore Conglomerato. C. B.

C. minor rotundi folia vulgaris.

C. alpina lini folia Cærulea

C. alpina teucrii folio angulato. Juss.

C. alpina rotundi folia minor. C. B.

C. hortensis folio et flore oblongo Cæruleo. C. B.

C. Pyramidata altissima Juss.

C. Calicibus lamellis quinque notatis pedunculis uni floris

Trachelium asureum umbelliferum. Ponæ.

Rapuntium americanum flore dilute Cæruleo actorum academiæ

R. maximum Coccinæo Spicato flore. Columnæ

R. Trachelii folio flore purpurascente. Plumerii

R. treus Solonieuse violaceo flore Moris.

R. americanum virgæ aureæ folio parvo flore subcoeruleo just.

Rapunculus Spicatus albus. C. B.

R. Spicatus. C. B.

R. folio oblongo Spica orbiculari. C. B.

R. Scabiosæ Capitulo Cœruleo

Psyllium majus erectum. C. B.

P. majus Supinum. C. B.

P. dioscoridis vel indicum crenatis foliis. C. B.

Plantago latifolia Sinuata quinque nervia. C. B.

P. latifolia incana. C. B.

P. latifolia incana Spica alba. h. Edinburgensis

P. Canadensis latissimo folio glabro

P. angustifolia major. C. B.

P. angustifolia albida. Monspeliensis.

P. angustifolia albida hispanica

P. angustifolia Paniculis Lagopi. C. B.

P. media incana virginiana Serratis foliis annua. Moris.

P. foliis linearibus Spica oblonga.

P. maritima minima gramineo folio rigido. just.

P. maritima major tenuifolia. just.

P. gramineo folio major. just.

P. palustris gramineo folio monanthos just.

Coronopus hortensis. C. B.

Dentaria heptaphyllos. C. B.

D. Pentaphyllos foliis mollioribus. C. B.

Napus Sativa. C. B.

Raphanus minor oblongus. C. B.

Raphanistrum Ægyptium siliquis longissimis nodosis.

R. arvense flore albo Inst.

R. flore purpureo aut dilutè violaceo. Morisonii.

R. segetum flore luteo vel pallido. Inst.

R. Rapistrum arvense folio auriculato acuto. Inst.

R. orientale acanthi folio. Cor. Inst.

R. Pannonicum radice maxima esculenta.

R. maximum rotundi folium monospermum. Cornuti

R. monospermum. C. B.

Sinapi hispanicum pumilum album. Inst.

S. apii folio sive album. C. B.

S. hispanicum nasturcii folio. Inst.

S. indicum lactucæ foliis angustioribus. Hermanni.

S. arvense præcox semine nigro. Morisonii

S. foliis subincanis siliquis brevissimis

Eruca minimo flore Monspeliensis

E. Bellidis folio. Morin.

E. procumbens alba siliquis singularibus

E. latifolia alba sativa dioscoridis. C. B.

E. sinica floribus luteis

E. tenui folia perennis flore luteo. J. B.

E. sylvestris major lutea caule aspero. J. B.

1 Sisymbrium aquaticum. Matthioli.

2 S. aquaticum raphani folio, siliqua breviori. Inst.

S. Erucæ folio aspero flore luteo. Inst.

6 S. Erucæ folio siliqua breviori

4 S. Erucæ folio glabro minus et præcocius. Inst.

5 S. Erucæ folio glabro flore luteo. Inst.

S. hispanicum folio oblongo, dentato
S. annuum absinthii minoris folio. just.
S. palustre minus siliqua aspera. just.
S. palustre repens nasturtii folio. just.

Erysimum foliis eratium, vel corniculatum C.B.
E. latifolium majus glabrum
E. vulgare. C. B.
E. Monspessulanum sinapios folio. Walterii.
E. angustifolium majus. C. B.
E. dentis leonis folio perenne Pyrenaicum. just.

Lepidium gramineo folio sive Iberis. just.
L. capillaceo folio fruticosum hispanicum just.
L. latifolium. C. B.
L. humile incanum arvense. just.

Nasturtium alpinum tenuissime divisum
N. sylvestre capsulis cristatis.
N. hortense vulgatum. C. B.
N. hortense crispum.
N. hortense latifolium. C. B.
N. ~~sylvestre~~ glauco folio.
N. orientale foliis inferioribus mille folium, superioribus perfoliatum referentibus. Morin.

Nasturtioides sive Nasturtium sylvestre. Clus.
N. hispanicum frutescens foliis subrotundis et asperis.

Cardamine quarta Dalecampii.
C. Pyrenaica latifolia purpurascente flore. D. Junieu
C. Pratensis magno flore purpurascente. just.
C. annua exiguo flore: just.
C. alpina prima trifolia. Clusii.

Erucago segetum. just.

E. Egyptia fructu verrucoso. Cor. just.

Myagrum monospermum latifolium

M. e Sumatra fructu spinoso

M. monospermum minus. C. B.

Cakile maritima angustiore folio

C. græca arvensis, siliqua striata brevi. Cor. just.

Alyssoides incanum foliis sinuatis. just.

Cochlearia folio cubitali just.

C. folio subrotundo. C. B.

C. aremorica. h. R. P.

C. altissima glasti folio just.

C. montana sive Thlaspi myagrodes. Pona.

Thlaspi arvense siliquis latis. C. B

T. perfoliatum minus. C. B

T. creticum quibusdam flore rubente. J. B.

T. umbellatum arvense amarum. J. B.

T. lusitanicum umbellatum gramineo folio purp=urascente. just.

T. virginianum foliis Iberidis amplioribus et serratis

T. rosa de hierico dictum. Moris.

T. vulgatius C. B

T. saxatile, vermiculato folio. C. B.

T. parvum saxatile flore rubente. C. B.

huitieme Leçon

Alysson perenne incanum leucoii folio flore luteo, fructu obtuso et veluti cordato

A. perenne incanum procumbens, foliis subrotundis

A. incanum serpilli folio fructu nudo. just.

A. incanum luteum Serpilli folio minus. just.
A. fruticosum incanum just.
A. Creticum foliis angulatis flore violaceo. Cor. just.
A. orientale turritidis folio flore luteo. Cor. just.
A. fruticosum aculeatum. just.
A. Creticum Saxatile foliis undulatis incanis. Cor. just
A. alpinum hirsutum luteum. just.
A. maritimum. just.

Chamælina Sive myagrion. Dodo.
C. Sive myagrion Dod. fructu majore.

Thlaspidium apuleum, Spicatum. just.
T. hirsutum Calice floris auriculato just.
T. Egyptiacum fructu minimo
T. fruticosum leucoii folio Semper florens. just.

Bursa pastoris major folio non sinuato. C. B.
B. pastoris major folio Sinuato. C. B.

Leucoium hesperidis folio just.
L. verum perenne album minus just.
L. verum perenne album majus. just.
L. incanum majus. C. B.
L. incanum minus floribus rubentibus. C. B.
L. album odoratissimum folio viridi. C. B.
L. luteum vulgare. C. B.
L. foliis Conferto Capitulis recurvatis et undatis
L. maritimum candidum. C. B.

Hesperis maritima angusti folia incana just.
H. maritima Supina exigua. just.
H. hortensis flore purpureo. C. B.
H. maritima latifolia Siliqua tricuspidi. just.

H. chia saxatilis lencoii folio serrato flore parvo. Cor. inst.
H. flore albo minimo siliqua longa folio profunde dentato. Boerh.
H. lencoii folio non serrato siliqua quadrangula
H. lencoii folio serrato siliqua quadrangula. inst.
H. allium redolens. Moris.
H. montana pallida et odoratissima. C. B.
H. exigua lutea folio dentato angusto. Boerh.
H. lutea siliquis strictissimis. inst.
3 Lunaria major siliqua rotundiore. J. B.
1 L. lencoii folio siliqua oblonga majori inst.
2 L. lencoii folio siliqua oblonga e foliorum alis erumpente
L. siliqua oblonga intorta. inst.
L. Ægyptiaca parva nasturtii folio flore purpureo
L. major siliqua longiore. J. B.
Brassica arvensis. C. B.
B. maritima arborea seu procerior ramosa. Moris.
B. fimbriata. C. B.
B. caulo rapa. J. B.
B. lato apii folio. C. B.
B. cauliflora. C. B.
B. alba vel viridis. C. B.
B. campestris perfoliata flore purpureo. C. B.
B. campestris perfoliata flore albo. C. B.
B. capitata alba. C. B.
B. capitata rubra. C. B.
Turritis minor Botanici Monspeliensis
1 T. Lobelii
T. foliis inferioribus cichoraceis. ceteris perfoliatæ. inst.

T. annua verna flore purpurascente. just.
T. leucoii folio. just.
Isatis sylvestris minor lusitanica. h. L. B.
I. sativa vel latifolia. C. B.
I. sylvestris vel angustifolia. C. B.
Crambe orientalis, dentis leonis folio erucaginis folia. Cor. just.
C. maritima brassicæ folio. just.
Epimedium. Dod.
Sinapistrum indicum pentaphyllum flore carneo minus non spinosum. h. L. B.
S. zelanicum pentaphyllum viscosum flore flavo Burmanni.
Chrysosplenium foliis amplioribus auricu=
=latis. just.
Portulaca latifolia seu sativa. C. B.
P. angustifolia sive sylvestris. C. B.
P. curassavica lanuginosa procumbens, hermanni.
P. sedi folio flore albo. D. feuillee.
P. curassavica procumbens capraridis folio flore muscoso, capsula bifurcata. P. B.
P. africana semper virens flore rubicundo. C. B.
Trianthema. Linnæi specierum
helianthemoides portulacæ foliis amplioribus floribus racemosis rubris
h. arborescens portulacæ minoris folio floribus parvis
Crassula orbicularis repens foliis semper vivi Dillenii h. Elth.
C. portulacæ facie repens. Dillenii h. Elth.

C. frutescens Sedi folio acuto.
C. anacampserotis folio. Dillenii h. Elth.
C. altissima perfoliata. Dill. h. Elth.
C. minima flore tetrapetalo rubente
Cotyledon. africana frutescens flore umbellato coccineo. Commelini.
C. africana frutescens flore umbellato albo.
C. major arborescens afra foliis planis limbo purpureo et maculis viridibus ornatis. Boerh.
C. afra arborescens major foliis glaucis oblongioribus flore luteo. Boerh.
C. africana frutescens foliis orbiculatis limbo purpureo cinctis. Inst.
C. africana frutescens folio longo et angusto flore flavescente Commelini
C. cretica folio longo fimbriato. Dillenii h. Elth.
C. Capensis folio semiglobato. Dil. h. Elth.
C afra folio crasso, lato, laciniato flosculo aureo. Boerh
C. radice tuberosa longa repente. Moris.
C. major. C. B.
C. flore luteo media. h. lugd. B.
Kali Siculum lignosum floribus membranaceis. Bocc.
K. vermiculatum hispanicum viride fruticans. Barterii
K. spinosum foliis longioribus et angustioribus. Inst.
K. minus villosum. C. B.
K. Egyptiacum non spinosum tomentosum et incanum. Lippi.
Corispermum majus tartaricum hyssopi folium spicatum caulibus rubentibus. Ammanni

C. hyssopi folium. actorum ac. R. S.

Salicornia geniculata semper virens. just.

Spinacia vulgaris sterilis. just.

S. vulgaris capsula seminis aculeata. just.

Rabarbarum forte. dioscoridis et antiquorum just

R. folio oblongo crispo undulato flabellis spartiis.

Lapatum aquaticum folio cubitali. C. B.

L. aquaticum luteolæ folio. Bocc.

L. pulchrum Bononiense sinuatum. j. B.

L. hortense folio oblongo secundum Dioscoridis. C. B.

L. Ægyptiacum capsula seminis alba dentata. lyppi

L. folio acuto crispo. C. B.

L. folio minus acuto. C. B.

L. folio rotundo alpinum. C. B.

L. Canadense folio oblongo angusto

L. folio acuto rubente. C. B.

L. creticum supinum capsula seminis aculeata Dom Jussieu.

Acetosa pratensis. C. B.

A. montana lato rotundo folio

A. arborescens subrotundo folio ex insulis fortunatis Pluk

A. scutata repens. C. B.

A. rotundi folia hortensis C. B

A. rotundi folia alpina

A. americana foliis longissimis pediculis donatis C. B

A. arvensis lanceolata. C. B

A. ocimi folio Neapolitana. C. B.

Petiveria solani foliis loculis spinosis Plumerii.

Neuvieme Leçon

Beta communis, sive viridis. C.B.
B. rubra vulgaris. C.B.
B. pallidè virens major. C.B.

Atriplex latifolia seu alimus fruticosus latifolius. Morin.
A. hortensis alba sive pallidè virens. C.B.
A. hortensis rubra. C.B.
A. folio hastato seu delthoide Morin.
A. sylvestris fructu compresso roseo. C.B.
A. maritima laciniata. C.B.
A. maritima mauritanica frutescens polygoni foliis argenteis ramosa. Pluk.
A. maritima angustifolia procumbens. Moriss.
A. maritima hispanica frutescens et procumbens. jus.
A. angustissimo et longissimo folio. hermanni. h.l.B.
A. angusto, oblongo folio. C.B.

Chenopodium pes anserinus primus. Tabernæ
C. folio sinuato candicante. jus.
5 C. foliis ex linearilanceolatis, racemis nudis dicotomæ ramosis setis terminatricibus.
C. tartaricum botrioides folio laciniato.
C. sinense foliis longis angustis pedunculis ramosis
C. dentatum folio triangulari dentato. D. Vaillant.
C. stramonii folio. D. Vaillant.
8 C. hispanicum procerius folio delthoide jus.
10 C. quod atriplex mori fructu major seu frugifera major. Morin.
9 C. tartaricum frugiferum maximum

C. quod atriplex Sylvestris mori fructu. C. B.
C. Betæ folio. just.
C. folio triangulo just.
C. lini folio villoso just.
C. fetidum
C. angustifolium laciniatum minus: just.
C. annuum hirsutum folio breviori et capillaceo. just
C. foliis filiformibus acutiusculis caule recto. Linn.
C. quod Sedum minus fruticosum. C. B.
C. hispanicum fruticosum Sedi folio erectum
C. maritimum Kali folio
C. ambrosioides folio Sinuato. just.
C. ambrosioides mexicanum. just.
C. licopi folio perenne. Dillenii. h. Elth.
C. Semper virens foliis tenuiter incisis. Dil. h. Elt.

Blitum quod amaranthus fruticosus erectus Spica viridi laxa et Strigosa. Sloanes. Catalogi
B. americanum fruticosum minus.
B. africanum frutescens Spicis virescentibus.
B. africanum altissimum Spicis e viridi albicantibus
B. Cararu herba dicta Brasiliensibus lusitanis. Bredos georgii
B. indicum Spica multiplici rubra pendula
B. rubrum majus. C. B.
B. rubrum minus. C. B.
B. virginianum virens foliis subtus cinereis
B. indicum virens Spinosum. D. Jussieu
B. Sylvestre polyspermum parietariæ facie
B. album minus. C. B.

B. quod amaranthus græcus Sylvestris angustifolius Cor. just.
B. Sylvestre Spicatum foliis ex albo et viridi — variegatis. just.
B. tricolor colore hilariori
Amaranthus panicula Conglomerata. C. B.
A. Spicatus argenteus americanus. Boerh. judici
A. albus gangeticus Salviæ angustis foliis Panicula Conglomerata. Pluk.
A. judicus majoranæ folio panicula multiplici Candicante
Amaranthoides lychnidis folio Capitulis purpureis. just.
A. humile maderaspatanum Capitulis Candicantibus folio molli. Pluk.
A. humile Curassavicum foliis Cepea lucidis — capitulis albis. Parad. B.
A. marina repens polygoni folio. Capitulis argenteis Plumerii.
Cadelari horti malabarici.
C. malabarica folio rotundiore pubescens. Petiverii.
C. fructu lappaceo
2 Cannabis erratica. C. B.
1 C. Sativa. C. B
Cannabina Cretica florifera. just.
C. cretica fructifera. Cor. just.
Capparis Spinosa fructu minore folio rotundo C. B.
Reseda minor vulgaris. just.

R. Egyptiaca minor odoratissima
R. vulgaris. C. B.
R. foliis Calcitrapæ flore albo. Moris.
2 Luteola pumila pyrenaica linariæ folio. just.
1 L. herba Salicis folio. C. B.
Mercurialis testiculata Sive mas. Dios. et Plinii C. B.
M. Spicata Sive fœmina Dioscoridis et Plinii. C. B.
M. tricoccos hermaphroditica Sive ad foliorum juncturas ex foliosis cristatis julifera Simul et fructum ferens. Pluk.
M. montana Spicata
M. fruticosa incana testiculata. just.
Heliotropium majus dioscoridis. C. B.
H. minus Supinum. C. B.
H. curassavicum foliis lini umbellicati. Prodromi Paradisi batavi.
H. americanum foliis hormini. act. ac. R. P.
H. americanum Salviæ folio flore ex albo Coeruleo
H. arborescens folio teucrii flore albo in Capitula densa congesto. Boerh. judicii
Echium vulgare. C. B.
E. rubro flore. J. B.
E. lato plantaginis folio jtalicum. Barlerii
E. majus et asperius flore albo. C. B.
11 Lithospermum arvense minus. just.
L. Palustre minus flore Coeruleo. just.
L. hispanicum minus fructu Singulari duobus Seminibus Coalitis Constante.

L. minus repens latifolium. C. B.

L. majus erectum. C. B.

Pulmonaria Ægyptia calice vesicario flore purpureo.

P. alpina foliis mollioribus subrotundis flore coeruleo. Inst.

P. foliis Echii. Lobelii.

P. Sibirica calicibus abreviatis foliis radicantibus sub cordatis. Linnæi Specierum.

1 Buglossum arvense annuum lithospermi folio. Inst.

3 B. Creticum majus flore albo. Inst.

9 B. angustifolium majus flore coeruleo. C. B.

B. Ægyptiacum angustifolium flore pallidè flavescente parvo. D. Granger.

B. angustifolium semine echinato. Inst.

B. orientale flore luteo. Cor. Inst.

B. Sylvestre minus. C. B.

B. Lusitanicum foliis asperis oblongis angustioribus et crispis. Inst.

B. annuum minimum lithospermi arvensis facie Ægypticum

B. luteum minimum. Inst.

B. orientale angustifolium flore parvo coeruleo. Inst.

B. latifolium semper virens. C. B.

Borrago floribus albis. J. B.

8 B. floribus coeruleis

B. Constantinopolitana flore reflexo coeruleo calice vesicario. Cor. Inst.

Asperugo vulgaris. Inst.

Cynoglossoides folio Caulem amplexante actorum acad. R. P.

Cynoglossum montanum virenti folio minore flore. just.

C. creticum argenteo angusto folio. C. B.

C. creticum latifolium fetidum. C. B.

C. majus vulgare. C. B.

Plumbago quorumdam clusii historiæ

P. americana Betæ folio ampliori. Plum.

Cerinthe quorumdam major versicolore flore C. B.

C. quorumdam major Spinoso folio flavo flore. J. B.

C. alpina perennis flore striato. just.

Symphytum consolida major flore purpureo quæ mas. C. B.

S. majus tuberosa radice. C. B.

Omphalodes pumila verna Symphytis folio just

O. lusitanica linifolio. just.

Pitonia Scandens baccis niveis nigris maculis notatis. Plum.

P. humilis anchusæ foliis Plum.

P. arborescens chamædrys folia major. Plum.

P. arborescens chamædrys folia minor. Plumerii

Hydrophyllum. morini. horti Juncheti.

dixieme Leçon

Polemonium vulgare Cæruleum. just.

Lychnidea hirsuta repens flore Cæruleo

L. folio Melampyri. Dill. h. Elth.

L. Caroliniana floribus amplis purpureis folio latiore et acutiore

L. folio Salicino. Dill. h. Elth.

Franca maritima supina saxatilis glauca ericoides semper virens flore purpureo. Petiv.

F. maritima quadrifolia annua supina chamaesices folio et facie flore ex albo purpurascente. Micheli

Lychnis sylvestris alba simplex semine vidua. D. Vaillant.

L. sylvestris alba simplex. C. B.

L. sylvestris quae saponaria vulgo. Inst.

L. purpurea multiplex. C. B.

L. montana viscosa alba latifolia. C. B.

L. quae ocimoides minus sive album. Lug. hist.

L. viscosa flore muscoso minor. D. Vaillant. h. R. P.

L. viscosa flore muscoso. C. B.

L. viscosa foliis brevi lanugine aspersis. C. B.

L. sylvestris viscosa rubra angustifolia. C. B.

L. auriculae ursi facie. C. B.

L. sylvestris hirsuta annua flore minore carneo. Moris

L. hirta minor flore variegato. act. ac. R. P.

L. flore albo minimo. Raji.

L. supina sicula calice amplissimo striato. Inst.

L. lusitanica annua bellidis folio flore purpureo. Inst.

L. orientalis maxima buglossi folio undulato. Cor. Inst.

L. Chalepensis annua foliis parum hirsutis et angustis flosculis carneis pediculis infirmis biunciatibus insistentibus capsulis fere rotundis. Morisonii.

L. Ægyptia minor ramosa parvo flore latioris folio

nervoso

L. Ægyptia minor angustifolia flore parvo.

L. Ægyptia minor ramosa flore parvo albo

L. Ruthenica perennis hyssopi folio latiore flore albo

L. Septentrionalium foliis hyssopi floribus duo versu positis albis. Allerici.

L. maritima repens. C. B.

L. alpina Behen albo Similis folio acutiore

L. Sylvestris quæ behen album vulgo. C. B.

L. Sylvestris quæ behen album vulgo Calice florum purpurascente.

L. Sylvestris minima flore muscoso. Magnolii

L. orientalis annua Supina Anthirrini folio, flore minimo purpurascente. Cor. inst.

L. viscosa foliis inferioribus bellidi minori similibus flore minimo Carneo aut rubro Magnolii

L. Capensis noctiflora angustifolia flore albo.

L. Segetum rubra foliis perfoliata. C. B.

L. Segetum rubra foliis perfoliatæ flore minore

L. orientalis Calice pyramidato, Striato longissimo Cor. inst.

L. Sylvestris angustifolia Caliculis turgidis Striatis C. B.

L. noctiflora. C. B.

L. Segetum major. C. B.

L. Pyrenaica umbellifera minima inst.

L. orientalis bupleuri folio. Cor. inst.

L. minor Saxifraga Pluk.

L. Cretica maritima minima Portulacæ Sylvestris folio. inst

L. Coronaria Dioscoridis sativa. C. B.
L. umbellifera montana. helvetica
L. foliis lanceolatis subtrinervis rectis
L. calicibus pentaphyllis corimbis fastigiatis foliis linearibus caule assendente
L. pratensis flore laciniato simplici Moris. hist.
L. græca maritima sedi arborescentis folio et facie Cor. inst.
2 L. sylvestris alba spica reflexa. magnolii
1 L. noctiflora spica reflexa foliis glabris flore majore albo.
L. hirsuta flore coccineo major. C. B.
L. multiflora linariæ folio floribus minimis albis
L. alpina linifolia multiflora per ampla radice inst
L. viscosa purpurea latifolia levis. C. B.
L. Ægyptia myrti folia ramosa flore albo reflexo calice striato.
L. frutescens myrti folia behen albo similis. C. B.
L. Cretica parvo flore calice striato purpurascente Cor. inst.
L. ocimastris folio flore viridi. herm.
L. viscosa altissima ocimastri facie flore viridi muscoso. Triumphetti
L. orientalis saponariæ folio et facie flore minimo et multiplici. Cor. inst.
L. minima calice angusto longo hirsuto.
L. noctiflora angustifolia odorata inst.
L. multiflora elatior linariæ folio parvo flore inst
Cucubalus Plinii. h. lug. Bat.

Caryophyllus maximus ruber. C. B.
C. altilis major. C. B.
C. pleno flore minor. C. B.
C. multiplex laciniatus C. B.
C. simplex minor flore punctato. C. B.
C. ramosus flore candido cum corona purpurea
C. barbatus hortensis latifolius. C. B.
C. barbatus flore multiplici. C. B.
C. montanus umbellatus floribus luteis ferrugineis Barlerii
1 C. sylvestris prolifer C. B.
C. barbatus sylvestris. C. B.
C. flore tenuissime dissecto dilutius rubente. C. B.
C. petalis multifidis squamis calicinis ovato oblongis foliis subulatis
C. montanus capillarii folio.
C. minimus muralis. C. B.
C. sinensis supinus leucoii folio act. ac. R. P.
C. sylvestris vulgaris latifolius flore odoro simplici purpureo C. B.
2 Statice foliis angustioribus flore rubro Boerh.
3 S. Lugdunensis hist. just.
4 S. montana minor. just.
1 S. alpina major flore albo. just.
Polygonifolia vulgaris. D. Vaillant.
2 Minuartia floribus confertis dicothomis loeflingii. Linnaei specierum
3 M. floribus lateralibus alternis bractea longioribus Linnai specierum

Alsine pratensis gramineo folio angustiore. just.
A. Plantaginis folio. J. B.
A. altissima nemorum. C. B.
A. littoralis foliis Portulacæ. C. B.
A. Pratensis gramineo folio ampliore. just.
A. Saxatilis et multiflora Capillaceo folio. just.
A. media. C. B.
A. Polygonoides tenui folia flosculis ad longitudinem Caulis veluti Spicam dispositis Pluk.
A. minor multi caulis. C. B.
A. tenui folia. J. B.
A. Saxatilis ericæ foliis umbellatis Corimbis
A. Segetalis gramineis foliis unum latus Spectantibus Botanici Parisiensis
A. Spergula dicta major. C. B.
A. Spergulæ facie media.
A. Spergula Semine foliaceo nigro Moris.
A. Spergulæ facie minor Sive Spergula minor flosculo Subcoeruleo. C. B.
A. arenaria dicta. h. Amstelodamensis
A. minima flore fugaci just.
A. montana Capillaceo folio. C. B.
A. foliis linearibus acuminatis petalis florum integris Calice duplo longioribus. Le monnier

Myosotis arvensis polygoni folio. just.
M. arvensis Subhirsuta flore majore. just.
M. arvensis hirsuta parvo flore just.
M. incana repens just.
M. hispanica Segetum just.

M. orientalis perfoliata Lychnidis folio. Cor. inst.

Loefflingia hispanica. Linn. Specierum.

Polycarpon tetraphyllum. Linn. Spe.

Pharnaceum pedunculis uni floris lateralibus Linn. Specierum.

P. pedunculis lateralibus folia aequantibus sub umb=ellatis. Linn. Specierum

Camphorata hirsuta. C. B.

Polygonum latifolium. C. B.

P. maritimum latifolium. C. B.

P. Caule fruticoso Calicis foliolis duobus reflexis. Linn.

Atraphaxis inermis. Linn.

Paronichia hispanica fruticosa myrti folio. inst.

P. hispanica. Clusii

P. narbonensis erecta. inst.

Herniaria glabra. J. B.

Monniera

Anagallidastrum quod alsine palustris minima flosculis albis fructu coriandri exigui

Anagallis phoeniceo flore. C. B.

A. Coeruleo flore. C. B.

A. flore obsoletè purpureo. Parkinsonii

Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascente

Dodecatheon Linn. Specierum

Onzieme Leçon

Veronica flosculis cauliculis adhaerentibus.

V. trifidis vel quinque fidis foliis flosculis absque pedunculis

V. spicata angustifolia

V. spicata longi folia. inst.

V. spicata lanuginosa et incana floribus coeruleis.
V. flosculis oblongis pediculis incidentibus chamaedryos folio. Morisonii.
V. spicata Cambro-britannica Bugulae subhirsuto folio Raji synopsis.
V. virginiana procerior foliis ternis et etiam quinis caulem amplexantibus spicis florum candidissimis Plut.
V. spicata latifolia. C. B.
V. multicaulis. Pannonica. just.
V. spicata minor. C. B.
V. mas supina et vulgatissima. C. B.
V. supina facie teucrii pratensis. Lobelii.
V. minor foliis imis rotundioribus. Moris.
V. maxima pyrenaica non ramosa. just.
V. orientalis minima foliis laciniatis. Cor. just.
V. pratensis serpilli folio. C. B.
V. terrestris annua folio polygoni flore albo. moriss.
V. alpina frutescens. C. B.
V. alpina bellidis folio hirsuta. C. B.
V. ~~aquatica~~ angustiore folio. just.
V. aquatica major folio subrotundo moriss.
V. aquatica major folio oblongo. Moris.
Ephedra maritima major just.
E. maritima minor just.
E. cretica tenuioribus et rarioribus flagellis. just.
Juncago palustris et vulgaris just.
J. maritima. Bartelii
Juncus angusti folius villosus floribus albis pani=
=culatis. just.

J. nemorosus latifolius major. juss.
J. palustris humilior erectus juss.
J. foliis articulosis floribus umbellatis. juss.
J. levis panicula sparsa major. C. B.
J. montanus palustris. Raji historiæ.

Asparagus aculeatus alter tribus aut quatuor spinis ad eundem extortum. C. B.
A. maritimus crassiore folio. C. B.
A. sylvestris tenuissimo folio. C. B.
A. foliis falcatis ex uno puncto numerosis. Burmanni
A. sativa. C. B.
A. africanus scandens Myrti folio. h. Pisani
A. aculeatus maximus sarmentosus zelanicus h. L. B.
A. aculeatus spinis horridis. C. B.
A. foliis acutis. C. B.

Acorus verus sive Calamus aromaticus offici. C. B.

Saururus foliis profunde cordatis ovato lan-ceolatis spicis solitariis folio longioribus. Linn. h. Clif

Piper foliis ovatis enervis. Linn. Synopsis
P. foliis cordatis petiolis caule herbaceo. Linn Speci.

Arum venis albis maximum italicum. B. Vaill.
A. scorsoneræ folio. juss.
A. africanum flore albo odorato. P. B.
A. maximum Ægyptiacum quod vulgo Colocasia C. B.
A. minus esculentum sagittariæ foliis viridi nigricantibus Sloanes Catalogi
A. minus nymphææ foliis esculentum Sloanes Cata.
A. hæderaceum amplis foliis perforatis. Plum.
A. palustre arundinacea radice. herm. h. L. B.

A. Canadense betæ folio. Saraceni

= **Arisarum** Latifolium majus. C. B.

= **Dracunculus** polyphyllus major indicus serotinus immaculato caule. D. Vaillant.

D. polyphyllus. C. B.

D. sive serpentaria trifilla brasiliana. act. a. R. S.

= **Tithymalus** charatias folio lanuginoso. C. B.

T. myrtinites latifolius. C. B.

T. linariæ folio flore lunato. Morin.

T. annuus lini folio acuto. Botanici Monspeliensis

T. helioscopius. C. B.

T. rotundis foliis non crenatis hermanni.

T. sive Esula exigua. C. B.

T. arvensis latifolius germanicus. C. B.

x T. arboreus Prosperi alpini

T. latifolius Cataputia dictus. herm.

T. charatias rubens peregrinus

T. maritimus spinosus. C. B.

T. myrsinites fructu verrucæ simili. C. B.

T. Epithymi fructu Columnæ

T. montis Baldini amygdali angustiori folio hirsutus

T. sylvaticus lunato flore. C. B.

T. Cyparissias Prosperi alpini

T. arboreus africanus. just.

T. Canariensis frutescens linariæ folio h. Amstelod.

T. ramosissimus frutescens pene aphyllus. herm.

T. indicus vimineus ~~Palustris~~ penitus aphyllos. Boerh.

T. Canadensis flore magno albo

T. amygdaloides angustifolius Taberna montana.

T. oleæ folio glauco Narbonensis. Just.
T. maritimus. C. B.
T. hybernicus vasculis muricatis erectis. Dill. h. Elt.
T. characias sanguineus illiricus. h. Catholici
T. palustris fruticosus. C. B.
T. characias folio serrato. C. B.
T. orientalis salicis folio caule purpureo flore magno. Cor. Just.
T. characias radice repente scholæ Botanices
T. maritimus juniperi folio. Bocc.
T. americanus annuus foliis serratis et maculatis
T. humifusus floribus in capitulum alis adhærens congestis. Pluknetii
T. maritimus folio obtuso acuto rubro. Perind. act. acad. R. Parisiensis.
T. exiguus glaber nummulariæ folio Just.
T. Cyparissias. C. B.
T. arboreus americanus Cotini folio. h. amstelod.

Apocynum maritimum venetum salicis folio flore albo. Just.
A. virginianum flore herbaceo siliqua longissima morissonii
A. persicariæ mitis folio corniculis lacteis. Dill. h. Elt.
A. Curassavicum fibrosa radice floribus aurantii chamænerii foliis latioribus. Sodroni. P. B.
A. novæ angliæ subhirsutum fibrosa radice floribus aurantii. h. Lug. B.
A. minus rectum Canadense. Cornuti.
A. maritimum venetum salicis folio flore purpureo. Just.

A. erectum africanum villoso fructu Salicis folio glabro angusto. herm.

A. africanum erectum foliis subrotundis crassis floribus umbellatis albis. hermanni.

A. majus Syriacum erectum caule viridi flore ex albido. h. R. P.

A. americanum foliis androsæmi majoris. act. ac. Rs.

Periploca quæ apocynum folio subrotundo C.B.

× P. quæ apocynum scandens Pervincæ foliis viridi fructu villoso. herm.

P. quæ apocynum ~~Bithynium~~ arborescens altissima scandens folio subrotundo. Cor. just.

P. ~~quæ apocynum~~ foliis oblongis just.

P. Ægyptiaca sive Scammone Prosperi alpini

P. monspeliaca foliis acutioribus. just.

P. monspeliaca foliis rotundioribus just.

P. scandens foliis Convolvuli fructu alato Plumerii

P. quæ apocynum scandens fruticosum cortice fungoso brasiliensium. P. 63.

P. americana foliis oblongis hirsutis

P. foliis lauri flore albo umbellato

Asclepiastrum sive asclepias africana aizoides. just.

A. sive asclepias africana aizoides flore pulchro fimbriato C. 63.

Asclepias nigro flore. C. 63.

A. albo flore. C. 63.

Convolvulus angustissimo folio nostras cum auriculis. Pluknetii.

C minor americanus foliis longis obtusis auriculatis flore parvo
C. major albus. C.B.
C. argenteus umbellatus supinus. Inst.
C. indicus minor alsines folio flore rubicundo purpureo. Commelini.
C. spica foliis argenteis radice repente. Magnolii
C. minor argenteus repens acaulis ferme. h. R. P.
C. siculus minor flore parvo auriculato. Boccona
C. lusitanicus flore cianeo. Broysi
C. argenteus elegantissimus foliis tenuiter incisis Inst
C. argenteus umbellatus erectus Inst.
C. minor arvensis. C.B.
C. purpureus folio subrotundo. C.B.
C. indicus flore albo purpurascente semine albo - Magnolii
C. Carolianus foliis hederaceis angulosis flore albo parvo. D. Rand
C. folio lanato in tres lacinias diviso flore oblongo purpureo. Sloanes Catalogi.
C. Pentaphyllos minor flore purpureo. Plum.
C. caeruleus indicus myosotis folio
C. Syriacus et Scammonea Syriaca. Morissonii
C. maritimus nostras rotundifoliis Moris.
C. Pentaphyllos hirsutus. Plum.
C. multifidus glaber. Inst.
C. indicus Batatas dictus. Raji hist.
C. americanus hirsutus folio cordiformi
C. amplissimo folio cordiformi flore maximo purpurascente

C. foliis cordato oblongis flore magno

C. arboreus rotundi folius Pluk.

C Canariensis semper virens foliis mollioribus et incanis floribus ex albo purpurascentibus. C. B.

Quamoclite americana folio digitato flore coccineo. Plum.

Q. americana hederæ folio flore coccineo. C. B.

Viola martia purpurea flore simplici odoro. C. B.

V. martia major hirsuta inodora. Moriss.

V. martia inodora sylvestris. C. B.

V. cœrulea maxima cucumerinis foliis glabra canadensis

V. rotomagensis perennis tricolor repens chamædryos folio

V. tricolor hortensis repens. C. B

V. tricolor arvensis. C. B.

V. martia arborescens purpurea. C. B

V. alpina rotundi folia lutea. C. B.

V. alpina rotundi folia minor lutea h. R. P.

V. palustris rotundi folia glabra. C. B

Cardaminidum minus et vulgare Just

C. ampliori folio et majori flore Just

C. flore pleno

C. quinque folii folio vulgo molla. feuillee

Balsamina lutea sive noli me tangere. C. B

B. fœmina. C. B.

Douzieme Leçon

Aristolochia longa scandens foliis ferri equini effigie. Plumerii.



A. clematitis recta. C. B.
A. indica aromatica odorata minor. Caroli Rhuani
A. Pistolochia dicta. C. B.
A. Pistolochia altera. J. B.
A. rotunda flore ex purpura nigro. C. B.
Asarum. Dodon.
A. Canadense. Cornuti
Yucca foliis aloes. C. B.
Y. arborescens foliis rigidioribus rectis, serratis. Dil. h. Elt
Y. Draconis folio serrato, reflexo. Dil. h. Elth.
Y. foliis filamentosis. Morisonii.
Tamnus racemosa flore minore luteo palescente. Just
T. mas vulgaris seu sterilis. D. Vaillant.
Ruscus angustifolius fructu summis ramulis jnascente just.
R. latifolius fructu folio inascente
R myrti folius aculeatus just.
R. latifolius e foliorum sinu florifer et baccifer. Dil. h. Elth.
Conferva. Plinii.
Tubularia sive fucus tubulosus intestinorum forma. just.
Chara vulgaris fetida. D. Vaillant
Limnospongia vulgaris
hydroceratophyllum flore aspero quatuor cornibus armato. D. Vaillant.
Stellaria quæ lenticula palustris bifolia fructu tetragono. C. B.
S. quæ lenticula palustris angusti folia folio in apice dissecto. Lobelii

Limnopeuce. Valerii Cordi
Potamogeton perfoliatum Raji.
P. foliis angustis splendentibus. C. B.
P. foliis crispis sive lactuca ranarum. C. B.
P. ramosum angustifolium. C. B.
P. mille folium seu foliis gramineis ramosum Raji.
P. pusillum gramineo folio caule rotundo Raji hist.
Algoides vulgaris. B. Vaillant
Myriophyllum aquaticum minus clusii.
Lenticula palustris major. Columnæ
L. palustris vulgaris. C. B.
L. aquatica trisulca. C. B.
Menyantes palustre latifolium et trifillum just
Nymphæa alba major. C. B.
N. lutea major. C. B
Nymphoides aquis innatans. just.
Morsus ranæ foliis circinatis floribus albis
act. acad. Reg. Parisiensis.
Butomus Cæsalpini
Alisma plantaginis folio ampliore
A. plantaginis folio minor.
Sagitta aquatica major. C. B.
Sparganium ramosum. C. B.
Lemma Theophrasti
Lilium convallium album. C. B.
L. convallium floribus e folliculo prodeuntibus just.
Polygonatum latifolium vulgare. C. B
P. latifolium hellebori albi foliis C B
P. angustifolium non ramosum. C. B.

P. latifolium flore majore odoro. C. B.

Polygonatoides Spicata

P. racemosa

P. humillima Sive unifolium . Dod.

Lilianthos flore majore luteo. D. Jussieu

Smilax viticulis asperis virginiana folio hederaceo leni zarza nobilissima nobis. Pluk.

S. aspera fructu rubente. C. B.

S. orientalis Sarmentis aculeatis excelsas arbores Scandentibus foliis non Spinosis. Cor. just.

Clematitis Sylvestris latifolia. C. B.

C. Sive flammula repens. C. B.

C. Sive flammula Surrecta alba. J. B.

C. hispanica Surrecta altera et humilior flore albicante D. Vaillant.

C. Sive flammula Surrecta altera minor flore albicante elatior

C. cretica foliis piri incisis nunc Singularibus nunc ternis Cor just.

C. Coerulea repens. C. B.

C. Canadensis trifolia dentata flore albo. Boerhaave

C. orientalis apii folio flore e viridi flavescente posterius reflexo. Cor just.

C. coerulea erecta . C. B.

C. Coerulea erecta foliis angustioribus

Menispermum folio hederaceo Dil. h. Elth.

M. Canadense Scandens umbilicato folio. act. ac. R. P.

Granadilla folio tricuspidi flore parvo flavescente just.

G. Polyphyllos fructu ovato jussi.
G. hispanis flos passionis italis fabii Columnæ
+ G. fetida folio tricuspidi villoso flore albo. jussi.
G. folio angusto tricuspidi fructu olivæ forma jussi.
G. folio hederaceo flore et fructu minimis. jussi.
G. folio hastato holoserico petalis candicantibus fimbriis ex purpureo et luteo variis. Martyngenti
G. flore suave rubente folio bicorni jussi.
G. folio tricuspidi obtuso et oculato. feuillet
G. folio bicorni fructu hexagono utrinque acuminato plum.
G. Syrinamensis folio oblongo serrato. jussi.
Pervinca vulgaris latifolia flore cœruleo jussi.
P. vulgaris angustifolia flore cœruleo. jussi.
P. angustifolia variegata. jussi.
P. erecta foliis ovatis flore rubro indiæ orientalis
Jalapa mexicana tubo floris longissimo
J. officinarum fructu rugoso. jussi.
J. flore purpureo jussi.
Boerhaavia Solani folio minor semine glabro
B. scandens alsines folio
B. flore purpurea foliis crassis succulentis radice napiformi esculenta vulgo tasso
Capsicum fructu longo ventre tumido per summum tetragono. jussi.
C. fructu tereti spithamæo. jussi.
C. siliqua propendente cerasi forma jussi.

C. fructu rotundo minimo just.

Jasminoides africanum aculeatum Rhœmni aculeati foliis et facie act. acad. Reg. Paris.

J. aculeatum humile halimi minoris folio flore majori violaceo fructu crassiore per maturitatem flavescente micheli.

J. aculeatum salicis folio flore parvo ex albo purpurascente micheli.

J. sinense halimi folio longiore et angustiore

J. sinense halimi folio latiore et rotundiore

J. spinosum foliis rotundioribus floribus sub coeruleis Lilac spirantibus. D. Jussieu

J. laureolæ folio flore candido, interdiu odorato. Dill.

J. folio pishamini flore virescente noctu odoratissimo Dill. h. Elthamensis.

J. solani folio et odore

J. fetidissimum floribus viridibus baccis atro violaceis

Stramonium fructu spinoso oblongo flore albo. just.

S. folio hyosciami flore toto candido fructu propendente rotundo spinis innoxiis armato. Boerh.

S. ferox. Boccone

S. Egyptiacum flore pleno intus albo floris violaceo.

Phytolacca americana majori fructu. just.

P. arborescens

P. mexicana baccis sessilibus. Dill. h. Elth.

Belladonna majoribus foliis et floribus. just.

B. frutescens rotundi folia hispanica just.

B. erecta angusto flore violaceo

B. humifusa flore violaceo
Rivina quæ Solanoides americana circææ
foliis glabris. Just.
R. humilis racemosa baccis puniceis. Plumerii
Solanum Scandens seu dulcamara. C. B.
S. dulcamarum africanum foliis crassis hirsutis –
Dillenii h. Elth.
S. scandens seu dulcamara flore albo. C. B.
S. scandens foliis laciniatis
S. foliis quercinis. Raji
S. bacciferum vulgari simile africanum foliis frequentim
et profundius crenatis. Paradisi Batavi.
S. nigrum vulgari simile caulibus ex asperatis. Dill.
S. tuberosum esculentum. C. B.
S. Bonariense arborescens pappas floribus Dillenii. h. El.
S. fruticosum bacciferum. C. B.
S. Pomiferum frutescens africanum spinosum nigricans
borraginis flore foliis profunde laciniatis. hermanni
S. americanum tomentosum folio verbasci parvo fructu
flavescente. Plumerii
S. spinosum maxime tomentosum. Boccone
S. fruticosum indicum fructu rubro. Just.
S. frutescens acanthi folio. Plum.
S. aliud arborescens acanthi folio. Plum.
S. americanum molle foliorum nervis et aculeis fla
vescentibus fructu mammoso. Plum.
S. spiniferum frutescens spinis igneis americanum. Plukn.
S. fruticosum lauri foliis aculeatum. Plum.
S. lignosum africanum semper virens laurini foliis h. Elth.

S. africanum semper virens lauri folio flore parvo
S. amplissimo, anguloso hirsuto que folio fructu aureo maximo. feuillee.
S. frutescens longis foliis et angustis floribus purpurascentibus
S. officinarum acinis luteis. C. B.
S. officinarum acinis nigricantibus. C. B.

Alkekingi fructu parvo verticillato inst.
A. curassavicum foliis origani incani flore viete- sulphureo, fundo purpureo. Boerh. indici
A. maximum frutescens incanum
A. Bonariense repens bacca turbinata viscosa. Dill.
A. officinarum. inst.
A. virginianum bacca turbinata foliis subincanis.
A. indicum glabrum chenopodii folio. Dill. h. Elth.
2 A. virginianum fructu luteo. inst.
1 A. americanum majus latifolium viscosum et hirsutum D. houston.
A. indicum majus capuli dictum.
A. indicum minimum fructu virescente. inst.

Lycopersicon galenii.
L. fructu cerasi rubro. inst.
L. pimpinellae sanguisorbae folio. feuillee
L. arborescens amplissimis foliis angulatis fructu aureo Plum.
L. fructu rubro non striato. inst.
L. fructu striato duro. inst.

Melongena fructu oblongo violaceo. inst.
M. fructu rotundo. institutionum.

Trezieme Leçon

Nicotiana major latifolia. C. B.
N. minor C. B.
N. minor folio cordi formi tubo floris praelongo. feuillee
N. folio cordi formi calicis laciniis inaequalibus tubo floris ad collum patente.
hyoscyamus minor albo similis umbilico floris atro purpureo. Cor. just.
h. creticus luteus major. C. B.
h. peregrinus luteus minor annuus. h. R. M.
h. vulgaris vel niger. C. B
Coryndum ampliore folio fructu majore. just.
C. folio et fructu minori. just.
Triopteris Linnaei. h. Clif.
Cururu scandens pentaphylla. Plumerii.
Serjania scandens polyphylla et racemosa. Plum.
S. scandens triphylla et racemosa. Plum.
Mandragora fructu rotundo. C. B.
M. foliis asperis fructu parvo ovato et acuminato floribus violaceis. Cor. just.
M. flore subcaeruleo foliis minoribus fructu globoso just.
Basella h. malabarici.
B. sinensis foliis minoribus virentibus
B. foliis majoribus et caulibus virentibus crassioribus
B. americana semine capsulâ membranaceâ obvoluto
Bocconia racemosa sphondilii folio tomentoso Plumerii
Chelidonium majus vulgare. C. B.
C. majus foliis quernis. C. B.

C. majus foliis et flore minutissime laciniatis D. Vaillant

× Hypecoon tenui folium siliquis erectis tere-

=tibus. annuum.

H. latiore folio. just.

Argemone mexicana just.

A. mexicana flore albo

Papaver hortense semine albo sativum dioscoridi

album. Plinio. C. B.

P. hortense nigro semine sylvestre dioscoridi nigrum

Plinio C. B.

P. erraticum majus Rhœas. Dioscoridis Theophrasto Plinio

C. B.

P. erraticum capite oblongo hispido. just.

P. erraticum capite longiore hispido just.

8 P. erraticum capite longissimo, glabro just.

7 P. orientale hirsutissimum flore magno. Cor. just.

6 P. erraticum pyrenaicum flore flavo. C. B.

9 P. erraticum nudi caule flore flavo odorato Dilem. h. Elt.

Glaucium hirsutum flore phœnicio just.

G. flore luteo. just.

G. flore violaceo just.

Aconitum pyrenaicum ampliore folio tenuiter

laciniato just.

A. Licoctonum luteum majus ampliore caule amplio

=ribus quæ foliis. Dod.

× A. Licoctonum orientale flore magno albo. Cor. just.

4 A. salutiferum seu anthora. C. B.

A. Coeruleum seu napellus primum. C. B.

A. violaceum seu napellus secundus C. B.

A. Caeruleo purpureum flore maximo seu napellus quartus. C. B.

A. Coeruleum minus sive napellus minor. C. B.

Delphinium segetum flore Coeruleo inst.

D. hortense flore majore et simplici Caeruleo. inst.

D. perenne montanum villosum aconiti folio inst.

D. perenne ranunculi foliis floribus azureis elegantissimis

D. Platani folio Staphisagria dictum inst.

D. latifolium parvo flore inst.

Polygala Caerulea Tabernae montana.

P. africana frutescens buxi folio maximo flore Oldenlandi

Fumaria lutea. C. B.

F. semper virens et florens flore albo. Boerh. judic.

F. officinarum Dioscoridis C. B.

F. foliis tenuissimis floribus albis. Circa monspelium nascens C. B. minor tenui folio. C. B

Cisticapnos africana scandens Boerh judic

Capnoides. inst.

Aquilegia pumila praecox canadensis Cornuti

A. flore roseo multiplici. C. B.

A Sylvestris. C. B.

Thalictrum majus siliqua angulosa aut striata C. B.

T. majus flavum foliis angulosis

T. pratense majus monspeliensium foliis rugosis. Vaillant

T. majus flavum staminibus luteis vel glauco folio. C B

T. alpinum aquilegiae foliis florum staminibus purpurascentibus. inst.

T. majus flavum lobis foliorum brevioribus subrotundis.

T. minus. C. B.
T. americanum minus Parkinsonii
T. minus asphodeli radice magno flore. just.
T. minus asphodeli radice parvo flore. just.
T. minimum fetidissimum. C. B.
Ruta hortensis latifolia C. B.
R. Sylvestris major. C. B.
R. Sylvestris minor C. B.
Harmala dodonei
Orobanchoides nostras flore oblongo flav=
=escente. act. ac. R. S.
Garidella foliis tenuissime divisis. just.
Nigella orientalis flore flavescente semine alato
plano. Cor. just.
N. cretica. C. B.
N. latifolia flore majore simplici coeruleo. C. B.
N. angustifolia flore majore simplici coeruleo. C. B.
Valeriana palustris minor. C. B.
V. alpina Scrophulariae folio. C. B.
V. hortensis phu folio olusatri dioscoridis C. B.
V. Sylvestris major altera folio lucido. D. Vaillant
V. Sylvestris major C. B.
V. foliis Calcitrapae. C. B.
V. maxima pyrenaica Cacaliae folio. D. fagon
V. rubra. C. B.
V. marina latifolia seu major alba. Morin.
V. rubra angustifolia C. B.
Valerianella erecta floribus luteis foliis diss=
=ectis. annuanni.

6 V. Cornu Copioides flore galeato. Moriss.
2 V. Semine umbelicato rotundo nudo. Moriss.
3 V. Semine umbilicato nudo oblongo. Moriss.

Filipendula foliis ternatis. Linn. h. Clif.
F. vulgaris an molon. Plinii. C. B.

Ulmaria clusii historiæ

Barba capræ floribus oblongis. C. B

Aralia Canadensis. Jussieu.
A. Canadensis humilior Zarzæ radicibus. Saraceni
A. arborescens Spinosa. Vaillant

Aureliana Canadensis Sinensibus ginseng
hiroquois garentoguen R. Patris Lafitau

Christophoriana vulgaris nostras racemosa
et ramosa. Morissonii.
C. americana racemosa baccis rubris. Moriss.
C. americana racemosa baccis niveis. moriss.
C. americana procerior et longius Spicata Dill. h. Elth.

Pimpinella Sangui Sorba minor levis. C. B.
P. Sanguisorba major. C. B.
P. major hispanica altera Conglomerato flore. Vaillant
P. Canadensis Spicâ longâ rubente Vaillant
P. maxima Canadensis. Cornuti.
P. Spinosa Seu Semper virens. Moriss.
P. agrimonoides odorata. h. R. P.

Clifortia foliis dentatis Linnæi h. clif.

Quatorzieme Leçon

Tragoselinum annuum quod apium pere-
-grinum foliis Subrotundis. C. B.

T. majus umbella candida. Inst.
T. orientale laciniatum umbella alba Cor. Inst.
T. alterum majus. Inst.
T. minus. Inst.

Phellandryum Dodonei

Œnanthe chærophylli folio. C. B.
Œ. apii folio. C. B.
Œ. maritima apii nigriore et crassiore folio. Magn.
Œ. aquatica. C. B.

Cuminum sive Cyminum sativum J. B.

Crithmum sive fœniculum maritimum minus C. B.

Cuminoides vulgare. Inst.

Caucalis arvensis echinata ~~parvo~~ flore. et fru[ctu] C. B.
C. arvensis echinata magno flore. C. B.
C. major daucoides tingitana. Moriss.
C. monspeliaca echinato magno fructu. C. B.
C. arvensis echinata latifolia. C. B.
C. pumila maritima. C. B.
C. Dauci sylvestris folio echinato magno fructu. Mag.

hydrocotile vulgaris. Inst.
h. zelanica asari folio Inst.

Chærophyllum siculum sophiæ foliis semine villoso Inst.
C. sylvestre seminibus brevibus hirsutis. Inst.
C. sativum. C. B.
C. sylvestre perenne cicutæ folio Inst.
C. sylvestre alterum geniculis tumentibus. D. Vaillant

C. sylvestre. C. B.

Myrrhis perennis albo minor foliis hirsutis semine aureo. Morisonii.

M. major vel Cicutaria odorata. C. B.

M. perennis lutea daucoides. Moris.

M. folio angelicæ rugoso hirsuto Boerh. judicii

M. palustris latifolia alba. Inst.

M. trifolia Canadensis angelicæ facie Inst.

M. orientalis folio angustiori peucedani semine villoso Boerh. judicii

M orientalis pastinacæ foliis læte virentibus. Inst.

Scandix semine rostrato vulgaris Caspari Bauhini

Cicuta major. C. B.

C. minor petroselino similis. C. B.

Cicutaria latifolia fetida. C. B.

Ligusticum quod Seseli officinarum C. B.

L. sive siler montanum angustifolium. C. B.

L. ferulæ folio Inst.

L. græcum apii folio. Inst.

L. alpinum multifido longoque folio. Inst.

L. Cicutæ folio glabrum Inst.

L. mei folio

Pastinaca sylvestris altissima Inst.

P. sativa latifolia. C. B.

P. balearica amplissimo folio brevi caule.

Daucus sativus radice alba. Inst.

D. sativus radice atrorubente. Inst.

D. vulgaris Clusii

B. Segetum minor. Vaillant
B. annuus minor floribus albis. just.
B. annuus ad nodos floribus. just.
Ammoides. C. B.
Carvi Cæsalpini
C. foliis tenuissimis asphodeli radice. just.
Sisarum germanorum. C. B.
Sium latifolium. C. B.
S. umbellatum repens. Gerardi
S. arvense sive segetum. just.
S. erucæ folio. C. B.
S. aromaticum sison officinarum. just.
Ammi majus. C. B.
A. perenne Moris.
Coriandrum majus. C. B.
C. sylvestre fetidissimum. C. B.
Apium anisum dictum semine suave olente majori. just.
A. macedonicum. C. B.
A. hortense seu petroselinum vulgo. C. B.
A. palustre et apium officinarum. C. B.
A. dulce celeri italorum. B. Vaillant.
A. petræum sive montanum album. J. B.
A. pyrenaicum thapsiæ facie. just.
Smyrnium peregrinum rotundo folio. C. B.
S. mathioli
Oreoselinum apii folio majus. just.
O. apii folio minus. just.
Tordylium maximum. just.

T. Ægyptiacum sive Secacul arabum et maurorum sive Pastinaca Syriaca . Rauvolfii .
T. quod Secacul arabum semine minore
T. minus limbo granulato Syriacum . Moris.
T narbonense minus . inst.
T. apulum minimum fabii Columnæ ..

Buplevrum rotundi folium perfoliatum annuum . inst.
B. folio subrotundo sive vulgatissimum C. B.
B. annuum angustifolium. Magnolii.
B. annuum minimum angustifolium h. R. Monsp.
B. arborescens salicis folio . inst.
B. frutescens foliis ex uno puncto numero plurimis junceis tetragonis . Burmanni .

Peucedanum gallicum rarioribus et brevi=oribus foliis . D. Vaillant
P. majus italicum . C. B.

Astrantia major Coronâ floris candida inst.
A. major Coronâ floris purpurascente . inst.
A. minor . Morisonii

Sanicula officinarum . C. B.
S. Canadensis amplissimo, laciniato folio. Saraceni

Laserpitium foliis latioribus lobatis. Moriss.
L. lobis angustioribus dilutè virentibus et multifariam divisis . Moriss.
L. gallicum . C. B.
L. selinoides semine crispo . inst.
L. latifolium non sinuatum . inst.
L. angustifolium non sinuatum . D. Vaillant.

Imperatoria major. C. B.
J. Sativa. Just.
J. Pratensis major. Just.
J. Lucida Canadensis. Just.
Angelica pratensis apii folio flore luteo
A. pratensis altera apii folio Just.
A. Sylvestris minor podagraria sive erratica C. B.
A. montana perennis palud apii folio. Just.
A. Canadensis tenui folia asphodeli radice Just.
A. montana perennis aquilegiæ folio Just.
Sphondylium vulgare hirsutum. C. B.
S. foliis angustioribus atro purpureis. Magnolii.
S. majus sive panax heracleum quibusdam. J. B.
S. alpinum glabrum. C. B.
Cachrys. semine fungoso sulcato plano minore foliis peucedani. Just.
C. semine fungoso sulcato plano majore foliis peucedani angustis. Moris.
C. orientalis ferulæ folio fructu alato plano. Cor. Just
Bulbocastanum majus folio apii. C. B.
Thapsia latifolia villosa. C. B.
T. foliis libanotidis fetidissima. C. B.
T. sive Turbith garganicum semine latissimo. J. B.
Anetum hortense. C. B.
Chysselinum palustre Just.
Ferula tenuiore folio. Just.
F. fœmina. C. B.
F. tingitana folio angusto lucido. H. lug. Bat.
F. Tingitana lucida hermanni.

F. durior seu rigidis et brevissimis foliis. Boccone
F. minor ad singulos nodos umbellifera. Inst.

Gingidium umbella oblonga. C. B.

Foeniculum annuum tragoselini odore umbella alba. D. Vaillant.

F. vulgare germanicum. C. B.
F. sylvestre elatius ferulæ folio longiori. Inst.
F. tortuosum. J. B.
F. orientale Fæseleos Massiliensis facie. Cor. Inst.
F. sylvestre perenne ferulæ folio breviori. Inst.

Meum foliis anethi. C. B.
M. alpinum umbella purpurascente. C. B.

Quinzieme Leçon

Tanacetum Ægyptiacum frutescens virga aurea folio flore purpureo. Lippi.
T. africanum frutescens foliis lavandulæ multifidæ longe minoribus grave olens. Boerh. Indic.
T. africanum fruticans multiflorum foliis tanaceti vulgaris decuplo minoribus. Commelini
T. vulgare luteum. C. B.
T. foliis crispis. C. B.
T. foliis et odore menthæ multifidis.
T. hortense folio et odore menthæ. herm. h. lug. B.

Conyza americana frutescens foliis atriplicis
C. major vulgaris. C. B.
C. hyspanica glutinosa odorata hyssopi folio. Tourn.
C. africana senecionis flore retusis foliis. herm. h. l. B.
C. latifolia viscosa suave olens flore aureo e gallo Provincia. Inst.

C. Egyptiaca frutescens altissima virgæ aureæ folio flore purpurascente. Lippi.
C. ~~egyptiaca~~ americana urticæ folio flore albo. jus.
C. arborescens purpurea folio verbasci undulato Plumerii.
C. americana Lamii folio jus.
C. americana Lamii folio flore Cæruleo
C. africana tenui folia Sub frutescens flore aureo Boerh. judici
C. malabarica Lamii folio flore purpureo Commelini
C. quæ Baccharis minor Salmensis folio Subrotundo Serrato Petiverii
C. cretica fruticosa folio molli Candidissimo et Tomentoso. Cor. jus.

Conyzoides flore flavescente Commo. act. ac. Regia Parisiensis

Coma aurea germanica Parkinsonii
C. aurea Egyptiaca repens Senecionis folio.
C. aurea africana fruticans foliis Crithmi marini h. amstelodamensis.
C. aurea fruticans foliis glaucis Succulentis digitatis odoratis. Boerh. judici

Eupatorium frutescens foliis lanceolatis tenuiter Serratis floribus albis Semilibus Corymbosis
E. Cannabinum floribus albis flore batavæ.
E. Cannabinum. C. B.
E. folio oblongo rugoso Caule purpurascente jus.
E. americanum Scandens hastato magis acuminato folio D. vaillant

E. virginianum longissimis et angustissimis foliis. Mor.
C. Scorodonia folio flore Coeruleo. Dill. h. Elth.

Bidens americana frutescens foliis subrotundis scabris
B. americana frutescens foliis oblongis serratis asperis
B. foliis tripartito divisis. Caesalpini. C. B.
x B. folio non diviso. Caesalpini
4 B. americana apii folio just.
6 B. americana apii folio latiore subhirsuto
5 B. Canadensis latifolia flore luteo. just.
7 B americana pentaphylla flore radiato. Plum.
8 B. virginiana anagyridis folio minor
B. Canadensis anagyridis folio elatior
B. Coreopsis foliis verticillatis linearibus multifidis flore virginicae
B. indica hyeracii folio Caule alato just.
B. americana annua Tanaci folio flore luteo parvo
B. Calice Squamoso flore amplo radiato Semi=flosculis non deciduis

Mille Folium orientale altissimum luteum abrotani folio. Cor. just.
M. tomentosum luteum. C. B.
M. nobile Tragi. just.
M. vulgare album. C. B.
M. purpureum majus. C. B.
M. maximum umbella alba. C. B.

Ptarmica alpina tanaceti foliis flore purpureo. just.
P. alpina matricariae foliis. Triumphetti.

P. alpina foliis profunde incisis. Just.
P. vulgaris pleno flore. Clusii
P. vulgaris folio longo serrato flore albo. J. B.
P. incana pinnulis cristatis. Cor. Just.
P. orientalis santolinæ folio flore majore. Cor. Just.
P. lutea suave olens. Just.
P. orientalis foliis tanaceti incanis semi flosculis florum brevioribus. Cor. Just.
P. orientalis foliis tanaceti incanis flore aureo. Just.
P. foliis pinnatis, pinnulis integris pedunculis uni floris

Buphtalmum tanaceti minoris folio flore albo. Just.
x B. tanaceti minoris foliis. C. B.
B. Egyptium minus cotulæ folio flore luteo.

Partheniastrum americanum ambrosiæ folio. Nissole.
x P. helenii folio. Dill. h. Elth.

Ambrosia maritima foliis arthemisiæ inodoris elatior Hermanni. H. Lug. Bat.
A. maxima inodora marrubii aquatici foliis tenuiter laciniatis virginiana, Pluknetii.
A. Canadensis altissima hirsuta platani folio. Just.
A. maritima Peruana major
A. absinthii incano folio Peruana.

Tarchonanthos africana foliis subrotundis trinervi dentato floribus luteis erectis
T. folio trinervi dentato floribus pendulis. Vaillant
T. salicis capreæ foliis odoratis. Vaillant.

Artemisia vulgaris major. C. B.

A. procerior foliis et capitulis tenuibus. Dill. h. Elth.

Absinthyum maritimum foliis superioribus in aliquot Lacinias divisis. C. B.

A. tanaceti foliis odoratissimum annuum

A. Corymbiferum annuum. Just.

A. Ponticum tenui folium incanum. C. B.

A. orientale fruticosum incanum amplo folio & tenuissime diviso. Cor. Just.

A. Seriphium hispanicum flore oblongo. Just.

A. Seriphium belgicum. C. B.

A. Ponticum seu romanum seu Dioscoridis. C. B.

A Santonicum Gallicum. C. B.

A. arborescens lobelii.

A. maritimum Seriphio belgico simile latiore folio odoris grati. Pluk.

A. Seriphium tenui folium incanum hispanicum

A hispanicum foliis virentibus et foliis superioribus in Lacinias aliquot palmatas divisis

A. alpinum Candidum humile. C. B.

Abrotanum tenui folium h. Chelseiani

A. lini folio acriori et odorato. Just.

A. mas angustifolium majus. C. B.

A. mas angustifolium incanum. C. B.

A. humile Corymbis majoribus aureis. B. Vaillant

A. hispanicum absinthii pontici folio. Just.

A. mas angustifolium maximum. C. B.

A. Campestre Cauliculis rubentibus. C. B.

Santolina foliis teretibus. Just.

S. repens et Canescens. Just.

S. foliis roris marini major. Inst.
S. foliis ericæ vel Sabinæ. Inst.
S. africana elatior bellidis foliis latioribus dentatis
flore magno
S. Spinosa foliis agerati. Boerh. Indic.
Chamæmelum marinum J. B.
C. Luteum Capitulo aphyllo. C. B.
C. nobile Seu odoratius. C. B.
C. chium vernum folio Crassiore flore magno. Inst.
C. vulgare Leucanthemum dioscoridis. C. B.
C. italicum repens odoratum flore luteo aphyllo
C. orientale vernum parvo flore ovariis flavescent=
=ibus. act. acad. Reg. Paris.
C. fetidum. C. B.
C. Lusitanicum foliis coronopi
Cotula maritima flore luteo elegante semine
ad oras villoso.
C. africana flore magno intus albo radiato extus
purpureo Sive Pyrethrum officinarum.
C. flore luteo radiato. Inst.
C. flore luteo nudo. Inst.
C. flore luteo. B. Vaillant.
Cacalia Pyrenaica alliariæ folio. Inst.
Anemonospermos africana foliis Cardui
benedicti florum radiis intus albicantibus. C. B.
A. afra folio Serrato rigido flore intus Sulphureo
extus purpureo. Boerh.
A. afra folio et facie taraxaci incanis. Boerh.
A. africana jacobeæ maritimæ foliis flore Sulphureo. C. B.

Chrysanthemum segetum Lobelii
C. exoticum minus capite aphyllo chamæmeli-
nudi facie . Breynii.
C. creticum clusii historiæ
Chrysanthemoides africana frutes-
=cens Leucoii foliis incanis.
C. africana frutescens leucoii foliis viridibus.
C. africana populi albæ foliis. act. ac. R. S.
C. africana populi albæ folio minor et spinosa
x C. osteospermum africanum odoratum spinosum
et viscosum. Commelini h. amstellodamensi.
C. americana altissima foliis amplis angulatis
osteospermum foliis oppositis palmatis. Linnæi
Tagetes maximus rectus flore simplici ex
luteo pallido . j. B.
T. indicus minor flore simplici sive caryophyllus
indicus sive flos africanus . j. B.
Porophyllum foliis subrotundis. Vaillant
Matricaria vulgaris . C. B.
M. flore pleno . C. B.
M. flore aphyllo . Vaillant
M. tanaceti folio flore majore semine umbilicato
juss.
M. tanaceti folio flore minore semina umbilicato
juss.
M. foliis tenuissimis achilleæ Cosuris
Jacobæa Egyptiaca Senecionis folio latiore
B. Granger
J. Egyptiaca annua Coronopi folio glauco. Lippi.

3 J. Pannonica prima. Clusii.
4. J. Ægyptia Senecionis folio multiflora Lyppi.
x J. hispanica Senecionis folio Crasso floribus purpurascentibus.
5 J. africana laciniata latifolia flore purpureo – Oldenlandi.
x J. africana frutescens crassis et Succulentis foliis C.B.
6 J. africana frutescens. Coronopi folio. C.B.
7 J. integro et Crasso hyeracii folio. Jnst.
8 J. Palustris altissima. foliis Serratis Jnst.
9 J. africana hederæ terrestris folio repens Commelini
10 J. Senecionis folio incano perennis Raji historia
11 J. vulgaris laciniata. C.B.
12 J. hispanica rorismarini folio. Jnst.
13 J. africana frutescens lavandulæ folio lattori. Comm.
14 J. africana arborescens atriplicis marinæ foliis
15 J. maritima. C.B.
16 J. africana frutescens foliis incisis et Subtus Cinetaceis Caspari Bauhini.
x J. alpina foliis longis Serratis. Jnst.
17 J. orientalis Cacaliæ folio. Cor. Jnst.
18 J. orientalis limonii folio. Cor. Jnst.
19 J. pratensis altissima limonii folio floribus dentioribus Jnst.
20 J. africana frutescens foliis longis et angustis et dentatis
21 J. Pratensis altissima limonii folio. Jnst.

Seizieme Leçon

Virga aurea americana folio Subrotundo

aceto serrato minor
V. aurea angustifolia serrata. C. B.
V. aurea latifolia serrata. C. B.
V. aurea novæ angliæ lato rigidoque folio. herm. Paradisi Bat.
V. aurea foliis non auritis, longioribus non serratis viridibus, caulibus rubentibus
V. aurea limonii folio panicula uno versu disposita D. Vaillant.
V. aurea Canadensis angustifolia non serrata. para. comi
V. aurea novæ angliæ altissima paniculis non nunquam reflexis flore Batavæ
V. aurea Canadensis latissimo folio glabro. just.
V. aurea americana foliis rotundioribus hirsutis dentatis
V. aurea Canadensis folio subrotundo serrato glabro just.
V. aurea americana paniculâ speciosâ flore majore altissima
V. aurea Canadensis altissima folio subtus incano. just
V. aurea angustifolia paniculâ speciosâ Canadensis D. Vaillant.
V. aurea omnium minima. h. R. P.
V. aurea Canadensis elatior salicis minoris folio.
V. aurea major foliis glutinosis et grave olentibus just.
V. aurea minor foliis glutinosis et grave olentibus
V. aurea Canadensis hirsuta paniculâ minus speciosa h. R. P.

V. aurea Canadensis foliis oblongis glabris floribus parvis Coeruleis.

V. aurea Canadensis altissima paniculâ Speciosâ foliis et Caulibus glabris.

V. aurea virginiana annua. Zanoni.

V. aurea flore albo Spicato. Breynii.

V. aurea Canadensis humilior Salicis minoris folio. juss.

V. aurea Canadensis humilior linariæ folio. juss.

V. aurea Canadensis elatior Salicis minoris folio summis ramulis rubentibus

V. aurea patula foliis auritis floribus dilute purpurascentibus. juss.

V. aurea patula foliis non auritis floribus dilute purpurascentibus. juss.

1 **Aster** Serotinus ramosus alter flore purpurascente Vaillant.

2 A. Canadensis Sub hirsutus Salicis folio Serotinus flore Coeruleo. juss.

3 A. Canadensis longissimo et angustissimo Serrato folio flore purpurascente.

4 A. grandiflorus asper Squamis reflexis. Dill. h. Elth.

5 A. Serotinus procerior ramosus bellidis Sylvestris flore D. Vaillant

6 A. Canadensis tripolii flore cœruleo majore

7 A. novæ Belgiæ latifolius umbellatus floribus dilute violaceis. hermanni h. lug. Bat.

8 A. novæ angliæ altissimus hirsutus floribus amplissimis purpureo violaceis. Paradisi Batavi.

9 A. acadiensis Corona Solis folio.

10 A. Ægyptius minimus ramosissimus hirsutus luteus parvo flore
11 A. acadiensis altissimus ramosus floribus albis. farauni
12 A. canadensis angustissimo folio floribus parvis umbell-atis aureis.
13 A. latifolius tripolii flore. D. Vaillant
14 A. tripolii flore. C. B.
15 A. africanus frutescens foliis angustis et plerumque conjunctis. h. amst.
16 A. salustris parvo flore globoso. just.
21 A. arvensis coeruleus acris. just.
17 A. caule ramoso scabro perenne foliis ovatis sessilibus pedunculis nudis uni floris. millerii
18 A. pyrenæus precox flore coeruleo majore. D. Vaillant
19 A. maritimus tuberosus luteus. just.
20 A. atticus luteus montanus villosus magno flore. C. B.
X A. pratensis autumnalis conyzæ folio. just.
22 A. maritimus folio tereti crasso tridentato. just.
23 A. omnium maximus helenium dictus. just.
A. asteri montano purpureo similis vel globulariæ. j. B.
A. atticus alpinus alber. C. B.
A. conyzoides odoratus luteus. h. Lth.
A. montanus luteus salicis folio glabro. C. B.
A. luteus radice odora. C. B.
A. atticus coeruleus vulgaris. C. B.
A. maritimus palustris coeruleus salicis folio just.
A. alpinus luteus conyzæ vulgaris folio just.
A. ramosus annuus canadensis. morisonii
A. chenopodii folio annuus flore ingenti specioso. Dill. h. Lth.

Asteriscus annuus foliis ad florem rigidis. Inst.
A. aquaticus annuus patulus. Inst.
A. maritimus annuus patulus. Inst.
Asteroides alpina Salicis folio Cor. Inst.
Senecio minor vulgaris. C. 63.
S. madraspatanus rapi folio floribus maximis cujus radix
ad non nullis china dicitur. Dill. h. Elth.
S. Bonariensis purpurascens foliis imis Coronopi
S. sive Conyza africana humilis foliis angustioribus
nervosis floribus umbellatis. Inst.
S. virginianus arborescens atriplicis folio. Parad. Batavi
S. montanus altissimus flore luteo non nunquam radiato
Obeliscotheca integri folia radio aureo
umbone atro rubente. Dill. h. Elth.
O. trifido folio. D. Vaillant.
Leucanthemum alpinum foliis profunde
sectis. Inst.
L. radice repente foliis latioribus serratis Inst.
L. orientale Costi hortensis folio. Cor. Inst.
L. Canariense foliis chrysanthemi Pyrethri sapore Inst.
L. vulgare Inst.
Kleinia foliis lanceolatis planis caule levi ventrico[so]
Linnaei horti Cliffortiani
K. foliis carnosis, lanceolatis, compressis caule tereti. Linn.
K. foliis carnosis, planis ovato oblongis. Linnaei h. Clif.
K. foliis oblongis cylindraceis
K. caule petiolis truncatis obvallato. Linn. h. Clif.
Eupatoriophalacron arborescens atrip=
=licis folio incano

E. americanum foliis subrotundis acuminatis ad auras crispis flore aureo parvo
E. Balsamine foemina folio flore albo. Dioscoridis.
E. menthæ arvensis folio. D. Vaillant.
Bellis sylvestris minor C. B.
B. cretica fontana omnium minima
Globularia Pyrenaica folio oblongo caule nudo. just.
G. vulgaris. just.
G. montana humillima repens. just.
G. fruticosa myrti folio tridentato just.
Calthoides africana procumbens folio integro glauco perennis
Caltha vulgaris. C. B.
C. arvensis. C. B.
C. caule fruticoso perenne foliis oblongis denticulatis
C. africana flore intus albo foris violaceo. just.
C. africana foliis profunde incisis flore intus albo foris purpurascente majore.
Corona solis humilis et repens
C. solis folio tenuiore et laciniato.
C. solis foliis amplioribus laciniatis just.
C. solis foliis angustioribus laciniatis. just.
C. solis trachelii folio angustiore
C. solis altissima virga aureæ foliis. just.
C. solis perennis flore et semine maximis. just.
C. solis minor foemina taberna;
C. solis parvo flore tuberosa radice. just.
C. solis altissima caule alata. just.

C. Solis trachelii folio latiore elatior.
C. Solis taberna
C. Solis minor disco atro rubente. Dill. h. Elth.
x C. Solis Salicis folio Caule alato latifolia
C. Solis Salicis folio alato Caule. just.
C. Solis angustifolia repens flore dilute luteo just.
C. Solis rapunculi radice. just.
Silphyum foliis ternis van Royen
S. foliis Connatis
S. integro amplissimo folio
S. foliis laciniatis
Doronicum Caule nudo Simplicissimo trifloro Linnæi. h. clif.
D. plantaginis folio. C. B.
D. radice dulci. C. B.
D. maximum foliis Caulem amplexantibus. C. B.
D. radice Scorpii. C. B.
Tussilago vulgaris. C. B.
T. alpina rotundifolia glabra. C. B.
Petasites major et vulgaris. C. B.
P. minor. C. B.
Elichrysum americanum latifolium. just.
E. montanum longiore et folio et flore purpureo. just.
E. Sive Stœchas Citrina latifolia. C. B.
E. orientale. C. B.
E. Seu Stœchas citrina angustifolia. C. B.
E. angustissimo folio. just.
E. obtusi folium basi latiore. h. Elth.
E. Sylvestre latifolium flore magno Singulari. just.

E. Sylvestre latifolium Capitulis Conglobatis C. B.
E. africanum fetidissimum amplissimo folio inst.
E. Latifolium erectum floribus Conglobatis. inst.
E. africanum luteum polii folio. Oldenlandi.
E. inodorum glabrum Coronopi folio annuum. Mag.
E. Spicatum. inst.
E. aquaticum ramosum minus Capitulis foliatis inst.
Filago maritima Capite folioso. inst.
F. Seu impia. Dodon.
F. Seu impia Capitulis tomentosis. D. Vaillant
F. Egyptia minima foliis tenuissimis
Gnaphalium maritimum. C. B.

Dixseptieme leçon

Lactuca romana longa dulcis. J. B.
L. Sylvestris Costa Spinosa. C. B
L. Sylvestris jtalica Costa Spinosa Sanguineis maculis aspersa. Parad. Bat.
L. Sylvestris foliis plurimum Laciniatis
L. Crispa. C. B.
L. Capitata. C. B.
L. Sylvestris angusto laciniato folio. Bot. monspel.
L. Canadensis altissima latifolia flore Leucophaeo. inst.
L. foliis Endiviae C. B
L. Perennis humilior flore Coeruleo. inst
L. hispanica maritima fruticosa Spinosa inst.
L. altissima Sonchi folio laciniato flore parvo Coeruleo Boerh.

L. alpina glabra acanthi folio flore magno Coeruleo B. Charles.

L. viscosa caule foliis obducto. Jus.

Hedypnois cretica minor annua. Cor. Jus.

H. annua Jus.

H. annua fructu et flore majore

Zacintha sive Cichorium vesicarium. Math.

Xeranthemum flore simplici purpureo majore. h. Lug. Bat.

Anaschovadi h. malabarici

A. angustiore folio.

Cichorium spinosum creticum. C. B.

C. latifolium sive Endivia vulgaris

C. crispum. Jus.

C. sylvestre sive officinarum flore Coeruleo. C. B.

Scolymus chrysanthemos. C. B.

S. chrysanthemos annuus. act. ac. Reg. Paris.

Rhagadiolus Lampsanae foliis. Cor. Jus.

Catanance flore luteo latiore folio. Jus.

C. quorumdam. Lugdunensis historiae.

Scorzonera palustris Bupleuri flora h. R. P.

S. latifolia sinuata. C. B.

S. foliis nervosis. C. B.

S. laciniatis foliis. C. B.

Tragopogon pratense luteum majus. C. B.

T. purpureo Coeruleum porri folio quod artifi vulgo C. B.

T. gramineo folio suave rubente flore Columnae.

Dens leonis tuberosa radice

D. Leonis foliis Erysemi vulgaris. Cor. inst.
D. Leonis minor foliis radiatis. C. B.
D. Leonis glaber angustiore et longiore folio flore minore. Moris.
D. Leonis latiore folio. C. B.
D. Leonis foliis hirsutis et asperis Saxatilis inst.
D. Leonis foliis hirsutis et asperis. h. R. Monspeliens.
D. Leonis minimus asper. inst.
D. Leonis tenuissimo folio. C. B.
D. Leonis qui pilosella officinarum. inst.

Hieracium sive pilosella major repens minus hirsuta. C. B.
H. hortense floribus atropurpurascentibus. C. B.
H. dentis Leonis folio, flore suave rubente. C. B.
H. medio nigro bæticum majus. Parkinsonii
H. proliferum faliatum. C. B.
H. foliis Endiviæ Capite magno striato Boerh.
H. montanum Latifolium glabrum majus. C. B.
H. montanum Latifolium glabrum minus. C. B.
H. fruticosum angustifolium majus. C. B.
H. murorum folio pilosissimo
H. murorum folio minus piloso non maculato h. R. P.
H. Pyrenaicum longi folium amplexi caule. inst.
H. Pyrenaicum folio Cerinthes latifolium Schola Bot.
H. Pyrenaicum folio Cerinthes angustifolium Sch. Bot.
H. fruticosum latifolium hirsutum. C. B.
H. fruticosum angustissimo incano folio. h. lug. B.
H. Pilosellæ folio erectum majus. inst.
H. majus dioscoridis tabernæ.

h. asperum majori flore in agrorum limitibus. J.B.
h. dentis leonis folio Capite echinato
h. luteum hirsutum. C.B.
h. montanum tomentosum. Moris.
h. villosum Chondrylla prior dioscoridis legitima
Clusio dictum. just.
h. intybaceum fructu rotundo Striato Lyppi.
h. dentis leonis folio obtuso majus. C.B.
h. intybaceum latifolium ramosum Capitulis rotundis
hispidis. Raji.
h. chondryllæ folio glabro radice Succisâ majus. C.B. —
h. magnum. Dalecampii
h. Echioides Capitulis Cardui benedicti. C.B.
h. montanum rapifolium. C.B.
h. folio Statices Caule nudo. just.

2 **Sonchus** asper laciniatus. C.B.
1 S. asper laciniatus creticus. C.B.
S. Levis angustifolius. C.B.
4 S. tingitanus papaveris folio. just.
5 S. Levis non laciniatus
6 S. asper non laciniatus dipsaci aut lactucæ folio C.B.
7 S. asper arborescens
8 S. repens multis hieracium majus. J.B.
9 S. angustifolius maritimus. C.B.
10 S. Levis laciniatus folius latifolius. C.B

Lampsana. dodonei.

Chondrilla Sonchi folio flore luteo palescente —
just.
C. Sonchi folio flore purpurascente major. just. ——

C. juncea viscosa arvensis quæ prima Dioscoridis. C.B.

C. hieracii folio annua. just.

Jacea tartarica flore luteo Capite oblongo.

J. Babylonica. C.B.

J. orientalis patula Carthami facie flore luteo magno. just.

J. cretica frutescens Elichrysi folio flore magno purpurascente Cor. just.

J. foliis laciniatis, Serratis maculatis purpurascente flore just.

J. annua foliis laciniatis Serratis purpurascente flore Tournefortii.

J. foliis Cichoraceis villosis altissima flore purpureo. just.

J. nemorensis altissima Centauroides. just.

J. nemorensis quæ Serratula vulgo. just.

J. quæ Serratula Novæboracensis maxima foliis longis Serratis horti Elthamensis.

J. nigra pratensis latifolia. C.B.

J. flore magno luteo laciniata Squamis Calicis ciliaribus Splendentibus

J. cum Squamis Cilii instar pilosis. J.B.

J. folio Cerinthes. e rupe victoriæ just.

J. foliis candicantibus laciniatis Calicibus [illegible]

J. quarta austriaca Capite villoso Clusii historia

J. vulgaris laciniata, flore purpureo. just.

J. tartarica Subincana laciniata flore purpureo.

J. Cretica aculeata incana. Just.

J. italica latifolia laciniata flore obsolete purpureo

J. montana Candidissima Stæbes foliis. C.B.

J. lusitanica Semper virens. h. R. P.

J. virginiana tuberosa angustifolia Spicata

J. Epidaurica candidissima et tomentosa. Inst.
J. Cinerea laciniata flore purpureo. Triumphetti
Cyanus floribus odoratus turcicus sive orientalis major Parkinsonii
C. orientalis major foliis magis dissectis flore luteo ex alepo. Morin.
C. orientalis flore luteo fistuloso act. ac. R. P.
C. montanus latifolius vel verbasculum cyanoides. C. B.
C. montanus caule folioso capitulo oblongo. Boccone
C. Segetum flore cæruleo. C. B.
C. Egyptius minimus ramosus caule alato flore purpureo parvo. Lippi
C. humilis hieracii folio flore purpureo. Inst.
Centaurium majus incanum humile capite pini. Inst.
C. majus folio in lacinias plures diviso. C. B.
C. majus alterum laciniatum purpurascente flore horti Regii Parisiensis
C. majus laciniatum flore obsolete purpurascente
C. majus orientale erectum glasti folio flore luteo. Inst.
C. majus laciniatum africanum. H. R. P.
C. majus foliis cynaræ. Cornuti.
C. majus folio helenii incano Inst.
Lappa major arctium Dioscoridis. C. B.
Xanthium dodonei
X. Canadense majus fructu aculeato aculeis aduncis munito. Inst.
X. Lusitanicum laciniatum validissimis aculeis munitum Institutionum.

1 Cinara hortensis non aculeata Capite subrubente h. R. P.

2 C. hortensis foliis non aculeatis. C. B.

3 C. Spinosa cujus pediculis Esitantur. C. B.

4 C. Sylvestris latifolia. C. B.

X C. Sylvestris, Boetica. clusii.

Dixhuitieme Leçon

11 Carduus Stellatus luteus foliis Cyani. C. B.

C. Stellatus Sive Calcitrapa. j. B.

C. Stellatus luteus Capitulo minus Spinoso. D. Vaillant

C. Lusitanicus Canescens alato Caule Capite lanuginoso. just.

C. Eryngoides capite Spinoso. prosperi Alpini.

C. Seu Polyacantha vulgaris. just.

C. foliis pinnatis glabris Capite Cum Squamis apice

C. melitensis Capitulis Conglobatis. just.

C. Stellatus luteus Spinis longioribus

C. minor Pulchrior galactites. J. B.

C. Creticus rapi folio. just.

C. Caule Crispo. j. B.

2 X C. mariæ non maculatus. h. R. P.

1 C. albus maculis notatus vulgaris. C. B.

5 C. galactites j. B.

3 C. Capite rotundo tomentoso. C. B.

4 C. lanceatus latifolius. C. B.

C. Creticus acanthi folio viridi et glutinoso flore pur=purascente. Cor. just.

8 C. hispanicus tomentosus erectus acanthi folio angustiori flore purpureo.

8 C. tomentosus acanthi folio vulgaris. Inst.
9 C. tomentosus acanthi folio alepicus magno flore Inst
7 C. parvus graecus acanthi folio tomentoso flore minori corollarii institutionum.
11 C. tomentosus acanthi folio angustiori. Inst.
10 C. orientalis tomentosus acanthi folio latiori profunde sinuato
12 C. tomentosus acanthi folio altissimus lusitanicus. Inst.
14 C. nutans. J B.
16 C. maritimus canescens alato caule. Inst.
~~17~~ C. hispanicus jaceae folio angustissimo capite cum squamis tricuspidibus
17 C. jaceae folio capitulis minoribus cum squamis tricus=pidibus. Inst.
15 C. stellatus foliis integris flore purpureo. h. R. P.
13 C. hispanicus acaulos polycephalos carlinae facie

3 Cirsium arvense sonchi folio radice repente flore purpurascente. Inst.
4 C. quod carduus nemorosus italicus. B. Jussieu.
2 C. Egyptiacum minus foliis ad limbum argenteis. Grange
5 C. pratense asphodeli radice latifolium. Inst.
C. acanthoides montanum flore flavescente. Inst.
C. montanum foliis longis serratis subtus incanis. hallerii
C. acaulos flore purpureo. Inst.
C. foliis non hirsutis floribus compactis. C. B.
C. pyrenaicum altissimum Inst.
C. singularibus capitulis parvis. C. B.
C. pratense polycephalon vulgare. Inst.
C. tricephalos alpinum. Inst.

C. anglicum Lobelii

Cnicus cernuus foliis Cordatis petiolis Crispis Spinosis amplexi=
=Caulibus floribus Cernuis. Linn. h. Upsaliensis

C. pratensis acanthi folio flore flavescente just.

C. atractylis lutea dictus. hermanni.

C. creticus atractylidis folio et facie flore Candidissimo
Cor. just.

C. polycephalos Canescens aculeis flavescentibus munitus
just.

C. albis maculis notatus flore albo. just.

C. hispanicus arboreus fetidissimus. flore purpureo just.

C. exiguus Capite Cancellato Semine tomentoso. just.

C. Coeruleus humilis et mitior. just.

C. Coeruleus humilis montis Lupi. hermanni.

C. Sylvestris hirsutior Sive Carduus benedictus. C. B.

Carthamus orientalis ilicis folio.

C. officinarum flore Croceo. just.

C. aculeatus Carlinæ folio flore multiplici veluti
umbellato. Cor. just.

Carlina Sylvestris vulgaris. Clusii

C. acaulos magno flore. C. B.

C. acaulos magno flore purpureo. C. B.

C. acaulos gummifera. C. B.

C. caulescens magno flore albicante. C. B.

Dipsacus Sativus. C. B.

D. folio laciniato. C. B.

Morina orientalis Carlinæ folio. Cor. just.

Eringium vulgare Cauliculis rubentibus

E. vulgare. C. B.

E. Creticum erectum folio multifido Caule et ramis pallidè virentibus. Cor. inst.
E. maritimum. C. B.
E. montanum ametistinum. C. B.
E. latifolium seu planum
E. Capitulis psyllii et ex Sicilia. Boccone.
Telephium dioscoridis
Telephioides græca humifusa flore albo. inst
Sphærantos folio oblongo major. Vaillant.
Echinopus minor annuus magno Capite. inst
E. minor. J. B.
E. major. J. B.
E. græcus tenuissime divisus et Lanuginosus Capite minori Cœruleo. Cor. inst.
Scabiosa peregrina capitulo oblongo nigricante odore Zibethi. C. B.
S. peregrina rubra Capitulo oblongo. C. B.
S. pratensis hirsuta quæ officinarum. C. B.
S. montana glabra foliis Scabiosæ vulgaris. C. B.
S. virgæ pastoris folio
S. folio integro glabro flore Cœruleo. inst.
S. quæ Dipsacus Sylvestris Capitulo minore vel virga pastoris minor D. Vaillant.
S. arborea prosperi alpini
S. argentea angustifolia. C. B.
S. Stellata annua prolifera. act. acad. R. S.
S. Stellata hispanica amplissimo folio. inst.
S. Stellata folio laciniato minor seu maritima. C. B.
S. maritima rutæ Caninæ folio. Boccone

S. Capitulo globoso minor. C. B.
S. Capitulo globoso major. C. B.
S. Laciniata flore ochroleuco semine majori e tartariâ
S. frutican Latifolia alba. C. B.
S. frutican angusti folia alba. C. B.
S. orientalis argentea foliis inferioribus incisis. Cor. Inst.
S. Cretica Capitulo pappos mentiente. Cor. Inst.
S. annua Centauroides fistulosa Francisci Cupani. h. Cat.
S. frutescens africana maxima. hermanni.
S. orientalis flore Caryophylli quorumdam. Boerh
S. alpina foliis Centaurii majoris. C. B.
S. glabra foliis rigidis viridibus. J. B.
S. Lusitanica, Indicæ simili. Inst.
S. ex alepo flosculis marginalibus amplioribus profundè dentatis et fimbriatis.

Agrimonia minor flore albo. Fran. Cupani
A. officinarum. Inst.
A. orientalis humilis radice crassissimâ repente frutex in spicam brevem et densam congesto. Cor. Inst.
A. odorata. Camerarii

Caryophyllata alpina Chamædryos folio Morisonii
C. alpina Lutea. C. B.
C. Canadensis agrimoniæ foliis flore majore Luteo
C. Pyrenaica amplissimo et rotundiori folio nutante flore ..
C. montana flore luteo nutante. D. Vaillant.
C. aquatica nutante flore. C. B.
C. vulgaris. C. B.

Tormentilla Sylvestris. C. B.
Pentaphylloides foliis pinnatis utrinque viridibus floribus Corymbosis
P. argenteum alatum seu potentilla jus.
P. supinum. J. B.
P. erectum J. B.
P. rectum fruticosum eboracense. Morisonii
P. foliis multifidis pinnatis flore luteo
P. palustre rubrum. jus.
Quinque Folium majus repens. C. B.
Q. folio argenteo. C. B.
Q. montanum erectum hirsutum luteum. C. B.
Q. rectum album. C. B.
x Q. foliis digitatis utrinque viridibus
Q. Pyrenaicum folio subtus argenteo. jus.
Q. minus repens luteum. C. B.
Fragaria foliis hirsutis utrinque viridibus foliis ovatis, serratis obtusis.
f. Chiliensis fructu maximo foliis carnosis hirsutis D. fraiser.
f. vulgaris. C. B.
f. virginiana fructu coccineo. Moris.
f. sterilis alpina caulescens. Vaillant
f. sterilis incana. Vaillant.
f. fructu parvi pruni magnitudine. C. B.

Dixneuvieme Leçon.

Geranium batrachioides montanum nostras Raji

2 G. Robertianum primum rubens. C. B.

3 G. Batrachioides folio aconiti flore caeruleo. C. B.

5 G. cicutae folio minus et supinum. C. B.

4 G. Columbinum Carolinum capsulis nigris hirsutis. Dill.

6 G. memphiticum althea folio glauco. Lyppi

7 G. Lucidum Saxatile. C. B.

8 G. olerae folio tenuiter laciniato flore pentapetalo purpurascente semine tenui

9 G. nodosum. C. B.

10 G. batrachioides odoratum. C. B.

7 G. romanum versicolor sive striatum Parkinsonii

12 G. folio malvae rotundo majus. C. B.

13 G. Columbinum perenne Pyrenaicum maximum. Just

11 G. folio altheae. C. B.

14 G. phaeum seu fuscum petalis reflexis. Moriss.

15 G. columbinum vinosum majori flore et ... florum bifidis. Magnolii

G. pusillum supinum maritimum altheae aut betonicae folio nostras. Raji hist.

16 G. annuum minus Batrachioides bohemicum purpureo violaceum. Morisonii

17 G. haemathodes sinense flore parvo rubente

18 G. pedunculis plerumque uni floris foliis quinque partitis, acutis foliolis pinnatifidis

19 G. Sanguineum maximo flore. C. B.

20 G. haemathodes flore variegato

G. montanum rotundi folium perenne flore purpureo majori. Barlerii.

21 G. tuberosum majus. C. B.

22 G. petreum cicutae folio radice crassa magnolii

23 G. cicutae folio acu longissimâ. C. B.

24 G. argenteum alpinum. C. B.

25 G. africanum noctu olens tuberosum vitis foliis hirsutis

26 G. africanum elatius malvæ folio laciniato odorato instar melissæ flore majore

27 G. africanum arborescens flore velut dipetalo eleganter variegato. Dillenii.

28 G. africanum arborescens alchimillæ hirsuto folio floribus rubicundis. Boerh.

29 africanū arborescens aconiti hirsuto folio elegantissimo variegato floribus rubicundis

30 G. africanum alchimillæ hirsuto folio floribus albidis hermanni.

31 G. africanum alchimillæ minus hirsuto folio flore albo

32 G. africanum arborescens ibisci folio rotundo Carlinæ odore hermanni.

33 G. africanum arborescens foliis cucullatis angulosis Dillenii. h. Elth.

34 G. africanum frutescens malvæ folio laciniato = odorato. hermanni.

35 G. africanum humile folio fragrantissimo molli Dillenii. h. Elth.

36 G. africanum arborescens malvæ folio plano lucido flore elegantissime Kermesino. Boerh.

37 G. africanum malvæ folio plano lucido flore pallide rubente

38 G. africanum foliis inferioribus asari superioribus Staphidisagriæ maculis splendentibus et acetosæ sapore. Commelini.

39 G. africanum noctu olens tuberosum et nodosum aquilegiæ foliis. hermanni.

40 G. africanum carnosum petalis angustis albicantibus. Dill. h. Elth.

41 G. africanum frutescens folio crasso et glauco acetosæ sapore. C. B.

42 G. africanum folio alceae flore coccineo fulgidissimo Boerh.

43 G. triste. Cornuti. C. B.

44 G. africanum noctu olens radice tuberosa foliis pastinacae incanis Lanuginosis angustioribus. herm.

45 G. africanum Coriandri folio floribus incarnatis minus. hermanni

46 G. myrrhinum tenui folium amplo flore purpureo B. jussieu

Malva Ulmi folia floribus Conglobatis ad foliorum alas. Plum.

M. Ulmi folia Semine rostrato. just.

M. americana abutili folio flore luteo Spicato foliis hirsutioribus et Crassioribus hermanni.

M. indica frutescens alni folio. hermanni.

M. indica foliis Subrotundis. just.

M. americana fruticosa folio Subrotundo flore luteo fructu aculeato majori.

M. americana foliis Cordatis Capsula seminis bidentata

M. rosea folio Subrotundo Chalepensis acaulos flore pallide luteo. Morin.

M. Sinensis erecta flosculis albis minimis Boerh

M. Syriaca pumila flosculis albidis cauliculis adhaerentibus

M. Sylvestris folio rotundo. C. B.

M. Sylvestris folio Sinuato flore albo h. hedemburgensis

× M. Sylvestris folio Sinuato. C. B.

M. Sylvestris folio Sinuato flore purpureo rubro francisci cupani. h. Catholici

M. foliis crispis. C. B.

M. rosea folio subrotundo floribus dilutius rubentibus Caspari Bauhini

Urena sinica Xanthii facie. Dill. h. Elth.

Triumphetta fructu echinato ramoso. Plum.

Heliocarpos. Linnaei h. Clif.

Malacoides betonicae folio. Just.

Xylon arboreum. J. B.

X. sive gossypium herbaceum. J. B.

1 Alcea foliis profunde dissectis pedunculis multifloris

x A. virginiana aceris folio flore parvo albo

2 A. africana frutescens ribesii folio minor flore rubro

3 A. capensis frutescens grossulariae folio majori hirsuto

4 A. americana flore parvo coeruleo et purpureo.

5 A. hirsuta. C. B.

6 A. vulgaris major flore ex rubro roseo. C. B.

7 A. cannabina. C. B.

8 x A. maritima gallo provincialis geranii folio. Just.

9 " Althaea maritima arborea veneta. Just.

10 A. frutescens folio acuto parvo flore. C. B.

A. hispanica foliis undulatis. Just.

" A. Dioscoridis et Plinii. C. B.

Malvaviscus arborescens flore miniato clauso. Dill. h. Elth.

Pentapetes foliis hastato lanceolatis serratis Linnaei Specierum

1 Ketmia zelanica fici folio perianthio oblongo integro. Dill. h. Elth.

2 K. folio manihot serrato flore amplo sulphureo. Dill. h. Elt.

× K. indica tiliæ folio. just.
3 K. americana hirsuta flore flavo et semine moschato just.
K. indica gossypii caulibus et pediculis foliorum rubentibus
K. indica spinulosa profunde laciniata acetosæ sapore Burmanni
K. Brasiliensis folio ficus fructu pyramidato sulcato just.
K. sinensis fructu subrotundo flore simplici. just.
K. africana populi folio. just.
K. africana populi folio subtus incano et caule virescente just.
K. vesicaria vulgaris. just.
K. vesicaria africana foliis lattioribus hirsutis
K. vesicaria africana. just.
K. syrorum quibusdam. C. B.
Abutilon dodonei
A. indicum j. B.
A. vesicarium flore et fructu majore non crispo. Dill.
A. flore magno carneo, longo pediculo insidente
A. majus arborescens flore magno albo
A. incanum flore carneo.
A. africanum caule angulato flore parvo luteo
A. americanum flore reflexo purpurascente
— A. indicum molle incanum flore parvo
A. vesicarium crispum floribus melinis parvis Dill. h. Elth.
A. indicum floribus umbellatis
A. periplocæ acutiori folio fructu stellato. Dill. h. Elt.

A. repens altheæ folio flore helvolo. Dill. h. Eltham.
A. Lavateræ flore fructu cristato. Dill. h. Elth.
A. Lavateræ folio flore albo fructu cristato
A. americanum folio vario hastato flore parvo-
Cæruleo. D. houston
Lavatera althea folio et facie flore albo, act.
acad. R. P.
Hermania frutescens foliis oblongis serratis
Just.
H. frutescens folio ibisci hirsuto molli Caule piloso. boerh
H. frutescens folio grossulariæ flore parvo hirsuto
Boerh.
H. frutescens folio lavandulæ latiore et obtuso flore
parvo aureo. Boerh.
Tribulus terrestris. J. B.
Fagonia cretica Spinosa. Just.
Oxys bulbosa africana rotundi folia Caulibus
et floribus purpureis amplis. J. B.
O. bulbosa Ethiopia minor folio Cordato flore ex albido
purpurascente. J. B.
O. lutea americana erectior Just.
O. Lutea. J. B.
O. flore albo. Just.
Lotus ruber Siliqua angulosa. C. B.
L. angustifolia flore luteo purpurascente. insulæ
Sancti jacobi. C. B.
L. æthyopicus argenteus flore singulari rubro. Parkin.
L. argenteus minor Gaditanus. Pluk.
L. polucheratos fruticosa cretica argentea siliquis

longissimis propendentibus. moris.
6 L. oligoceratos cretica lutea siliquis longis erectis Moris.
5 L. sive melilotus pentaphyllos minor glabra. C. B.
L. pentaphyllos flore majore luteo splendente. C. B.
L. siliquis ornithopodii. C. B.
8 L. pentaphyllos siliquosus villosus. C. B.
7 L. libica. Dalecampii
L. pratensis siliquosus luteus major et durior. C. B.
Genista juncea. J. B.
G. sive spartium purgans. J. B.
G. tinctoria germanica
Siliquastrum Castoris durantes. just.
S. Canadense. just.
Dorycnium monspeliensium Lobelii
D. majus. just.
Alhagi maurorum. Rauvolfii
Vulneraria rustica. J. B.
1 V. flore purpurascente. just.
2 V. pentaphyllos. just.
3 V. hispanica foliis pinnatis inaequalibus capitulis solitariis
Psoralea foliis pinnatis. h. Upsaliensis
P. trifolia odora latifolia
P. odora trifolia angustifolia
P. folio integro simplici rotundo
1 Trifolium montanum spicâ longissima rubente. C. B.
2 T. spicâ oblongâ rubrâ. C. B.
3 T. montanum album. C. B.
4 T. Phaeum fuscum luxurians quaternis quinis et senis foliis. moris.

T. Semen sub terram condens. D. Vaillant.
5 T. pratense folliculatum. C. B.
T. stellatum. C. B.
T. stellatum Egyptium
8 T. Capitulis dipsaci quorumdam. Raji historiæ
9 T. arvense humile spicatum sive Lagopus. C. B.
10 T. pratense luteum capitulo Lupuli vel agrarium
11 T. fragiferum tomentosum. Bot. Monsp.
12 T. fragiferum phrigium. Clusii
13 T. fragiferum nostras purpureum folio oblongo. Moris.
14 T. pratense purpureum. C. B.
T. pratense flore monopetalo breviori
15 T. Capitulo oblongo aspero. C. B.
T. Capitulo spumoso aspero minus. C. B.
T. Capitulis thymi. C. B.
18 T. Lagopoides flore subluteo. D. Vaillant
19 T. Pratense flore albo minus et fœmina glabrum. J. B.

Vingtieme Leçon

1 **Melilotus** Capsulis reni similibus in capitulum congestis. Just.

2 M. officinarum germaniæ. C. B.
3 M. italica folliculis rotundis. C. B.
4 M. major odorata violacea. Moris.
5 M. vulgaris altissima frutescens flore albo. Just.
6 M. Cretica fructu maximo. Just.
7 M. messanensis procumbens folliculis rugosis sublongis spicis florum brevioribus Raji hist.
8 M. lutea minor floribus et siliculis minoribus spicatim

et densè dispositis. Morin.

M. nona Berardi seu erecta folliculis rotundis minor Raji historia.

Medica cochleata polycarpos fructu minore compresso ad margines leviter echinato. Boerh.

M. scutellata. j. B.

M. fructu ovato hirsuto aculeis rigidioribus

M. arabica. Camerarii

M. tornata minor lenis. Parkinsonii

M. echinata. hirsuta j. B.

M. sylvestris. j. B.

M. polycarpos folio obtuso crenato. just.

M. spinosa dicarpos fructu ovali spinulis brevioribus et rigidioribus. Raji. hist.

M. hispanica fructu tribuloide h. Carolsruani

M. tornata major lenis. Park.

M. magno fructu aculeis sursum et deorsum tend=entibus. just.

M. Catalonica elegans. Raji historiæ

M. marina Lobelii.

M. orbiculata elegans orbiculis circum oras rugosis Raji hist.

M. tornata minima h. Carolsruani

M. orbiculata. j. B.

M. cochleata dicarpos capsulâ rotundâ spinosâ foliis eleganter dissectis. hermanni.

Crotalaria asiatica frutescens trifolia floribus luteis amplis. hermanni.

C. asiatica folio singulari flore luteo. Burmanni

x C. africana Styracis folio flore Coeruleo. Just.

Cytisus Spinosus hermanni.

C. Monspessulanus medicæ folio Siliquis densè Congestis et villosis. Just.

C. Canariensis Semper virens et incanus. Commelini

C. hirsutus. J. B.

C. incanus Siliquâ longiore. C. B.

C. alpinus latifolius flore racemoso pendulo. Just.

C. glaber nigricans. C. B.

C. glaber Siliqua lata. J. B.

C. Supinus foliis infernè et Siliquis molli hirsutie pubescentibus. Raji. x

Anonis procumbens maritima nostras foliis hirsutis pubescentibus Raji

A. Sicula alopecuroides. Just

x A. hispanica frutescens folio tridentato Carnoso. Just

A. montana præcox purpurea frutescens. Moris.

A. alopecuroides mitis annua purpurascens. Dill.

x A. Spinosa flore purpureo. C. B.

| A. pulchra visu foliis Ciceris ornithopodii Siliquis annuentibus. h. Catholici

A. viscosa Spinis Carens lutea latifolia annua. Mag.

A. viscosa Spinis Carens lutea major. C. B.

pusilla glabra angust folia lutea latifolia

A. viscosa foliis pinnatis, foliolis quinis incisis Stipulis dentatis.

flore luteo parvo h R P.

A. americana folio latiori Subrotundo. Just.

Phaseolus indicus Cochleato flore. Triumphetti

P. vulgaris lobelii

P. americanus Sive Lablab Semine roseo. Just.

L. punicea flore Cornuti
P. americanus semine villoso
P. minimus fructu viridi ovato. D. Vaillant. h.R.P.
Phaseoloides frutescens Caroliniana foliis pinnatis floribus coeruleis conglomeratis. Millerii
Clymenum Parisiense flore coeruleo. just.
C. hispanicum flore vario siliqua plana. just.
C. hispanicum flore vario siliqua articulata. just.
Ochrus folio integro capreolos emittente. C.B.
Ervum verum Camerarii
Lens major. C.B.
L. minor Dodonei
L. monanthos. hermanni.
Corallodendron triphyllum americanum spinosum flore ruberrimo. just.
C. humile spica florum longissima radice crassissima Catesbi.
Sophora tomentosa foliis subrotundis. Linnaei
S. glabra foliolis subrotundis.
S. subhirsuta foliolis ovatooblongis Linnaei
S. foliis glabris
Anagiris fetida C.B.
Spartium alterum monospermon semine reni simili. C.B.
S. tertium flore albo. C.B.
Lathyrus latifolius. C.B.
L. major Narbonensis angustifolius. J.B.
2 L. angustissimo folio semine rotundo. h.R.P.
3 L. sativus flore fructu que albo. C.B.

4 L. angustifolius siliquâ hirsutâ. C. B.
5 L. annuus flore coeruleo ochri siliqua. h. Lug. Bat.
6 L. distoplatiphyllus hirsutus mollis magno et peramoeno flore odoro. Cupani. h. Catholici.
7 L. arvensis repens tuberosus. C. B.
x L. sylvestris major. C. B.
8 L. luteus latifolius. Magnolii
10 L. sylvestris major folio angustiore flore parvo rubro
9 L. sativus flore sordidè rubro, semine cinereo. Mich.
11 L. folio ovato acuminato coeruleis viciae floribus et siliquis sibirica. amman.
12 L. sylvestris luteus foliis viciae. C. B.

Pisum spontaneum perenne repens humile Moriss.
P. hortense majus flore fructuque albo. C. B.
P. humile caule firmo Just.

Nissolia vulgaris Just.

Cicer sativum semine russo. C. B.

Arachidna quadrifolia villosa flore luteo Plumerii
x A. trifolia glabra

Vicia sylvatica multiflora maxima
V. supina latissimo folio non serrato. Just.
V. perennis incana multiflora. Bot. Monsp.
V. sylvestris lutea siliqua hirsuta. C. B.
V. sativa vulgaris semine nigro. C. B.
V. angustifolia siliquis pisi
V. Benghalensis hirsuta et incana siliquis pisi. herm.
V. angustifolia semine parvo rotundo.

V. Segetum cum siliquis plurimis hirsutis. C. B.
Aphaca Lobelii
Faba major recentiorum Lobelii
Citisogenista Scoparia vulgaris flore luteo. just
Pelecinus vulgaris. just.
Genista Spartium majus brevioribus et longioribus aculeis. just.
G. Spartium montis ventosi. just.
G. Spartium minus anglicum. just.
G. Spartium minus germanicum
Pseudoaccacia Sinica inermis flore luteo
P. vulgaris just.
Orobus Sylvaticus foliis oblongis glabris. just
O. Sylvaticus viciæ foliis. C. B.
O. Pyrenaicus foliis nervosis. just.
O. latifolius parvo flore purpureo. C. B.
O. Sylvaticus nostras. Raji.
Amorpha Linnæi. h. Clif.
Barba jovis pumila villosa flore globoso purpureo. Breynii
B. pulchre lucens. j. B.
B. hispanica incana flore luteo. just.
B. græca linariæ folio argenteo ampliori flore luteo. par
B. Lagopoides cretica frutescens incana flore spicato purpureo amplo. Breynii.
Ferrum Equinum germanicum siliquis in summitate. C. B.
F. Equinum siliquâ multiplici. C. B.
F. Equinum siliqua singulari. C. B.

Onobrychis fructu echinato major. C. B.

O. foliis viciæ fructu echinato major floribus dilutè rubentibus. C. B.

O. italica perennis erecta foliis viciæ, floribus dilute rubentibus fructu exiguo non echinato sed rugoso et cristato. Micheli. horti Pisani.

O. seu caput gallinaceum fructu maximo insigniter echinato. Lobelii

Scuridaca lutea major. C. B.

Coronilla seu colutea minima Lobelii.

C. caule genistæ fungoso. just.

C. cretica herbacea flore parvo purpurascente. just

C. herbacea flore vario. just.

C. maritima glauco folio. just.

C. siliquis et seminibus crassioribus. just.

Asphalatus frutescens major latifolius cortice aureo. ammanni.

A. laricis foliis ammanni.

A. arborescens pinnis foliorum crebrioribus oblongis. Amm.

Emerus. Cæsalpini

E. americanus foliis sericeis et incanis.

vingtunieme Leçon

Astragalus tuberosus scandens fraxini folio just.

A. villosus erectus spicatus floribus flavescentibus. amm.

A. luteus perennis procumbens vulgaris seu sylvestris morisonii.

A. annuus angustifolius flosculis sub cœruleis. Cauliculis

adherentibus. just.

A. annuus maritimus procumbens latifolius floribus pediculo insidentibus just.

A. alpinus procerior alopecuroides just.

A. humilis Siliqua Glyglotidis forma. just.

A. Glycyphyllos folio minori rotundiori apice inciso. Boerh.

A. luteus perennis Siliqua gemella rotunda vesicam referente. moris.

A. orientalis maximus incanus erectus. Caule ab imo ad Summum florido. Cor. just.

A. Caulescens erectiusculis floribus Spicatis leguminibus erectiusculis nudis, tumidis tereti depressis mucrone reflexo. Linnai. h. Upsaliensis.

A. orientalis altissimus galegæ foliis amplioribus, flore parvo flavescente. Cor. just.

× A. luteus annuus monspeliacus procumbens. Morisonii

A. Ægyptiacus Siliquis incurvis Contortis Canaliculatis. D. granger.

Caulescens diffusus Capitatis pedunculatis imbricatis... erectis

× A. monspessulanus. J. B.

A. orientalis angustifolius caule pedali flore e viridi — flavescente odoratissimo. Cor. just.

A. Canadensis flore e viridi flavescente. act. Acad. R. S.

A. Caulescens erectus caule glabro Sulcato. Linnæi Spec. erum

A. pumilus flore albido hermanni.

× Astragaloides. just.

1 A. lusitanica. just.

? A. Sinensis galegæ folio.

2 Colutea vesicaria. C. B.

1 C. orientalis flore Sanguinei Coloris lutea macula notato. Cor. inst.

3 C. foliolis ovatis integerrimis Caule fruticoso millerii

C. Aethyopica flore purpureo Breynii

C. africana annua foliis parvis mucronatis vesiculis Compressis. C. B.

C. africana annua foliis Cordatis et vesiculis minus compressis. C. B.

Tragacantha Massiliensis. J. B.

Abrus prosperi alpini.

Glyssyriza Siliquosa vel germanica. C. B.

G. capite echinato. C. B.

Medicago trifolia frutescens incana inst.

M. vulneraria facie hispanica. inst.

M. Sylvestris floribus Caeruleis

M. annua trifolii facie. inst.

Galega vulgaris floribus Caeruleis. C. B.

Hedysarum hispanicum annuum flore minore purpurascente

— H. clypeatum flore Suaviter rubente. H. Elth.

H. clypeatum minus flore purpureo Raji hist.

H. americanum trifillum Canescens floribus albis Spicatis. Boerh.

H. trifillum flosculis albis. ammanni.

H. frutescens hirsutum floribus paniculatis amplis purpureo violaceis

H. trifillum Zelanicum rotundifolium. Burmanni.

H. trifillum Canadense Cornuti

H. humile Capparis folio maculato. Dillenii. horti Elth.

- annuum minus Zeilanicum ... folio ...

Scorpioides bupleuri folio Siliquis lenibus Parkinsonii

S. Siliqua Crassa. Gerardi

1 Fœnum græcum Sylvestre meliloti facie. juss

2 F. græcum Sylvestre Polyceration majus Creticum. Brey.

3 F. græcum trifolii pratensis facie procumbens flore purpureo Corolato e Siberia.

4 F. græcum Sylvestre alterum Polyceration. C. B.

7 F. græcum Sativum. C. B.

1 Ornythopodium Portulacæ folio. juss.

2 Lupinus peregrinus major vel villosus Cæruleus major. C. B.

1 L. Sativus flore albo. C. B.

3 L. Sylvestris flore Cæruleo. C. B.

Indigo americana Sativa

I. Sativa Sive anil indorum

1 Corchorus Sive melochia. j. B.

2 C. foliis oblongis fructu gracili tricuspidato

x C. Sive melochia americana Carpini folio flore rubro fructu brevi.

3 C. americanus Siliquis emarginatis.

Melochia floribus Solitariis Capsulis pyramidatis pentagonis angulosis acutis. Linn. h. Clif.

x M. floribus Capitatis sessilibus Capitulis Subrotundis Linn. flore Selanicæ

Monospermalthæa arborescens villosa flore minore. act. acad. R. P.

x M. arborescens villosa folio majore act. acad. R. P.

Circæa Lutetiana. Lobelii

C. minima. Columnæ.

Alchimilla vulgaris. C. B.

A. alpina quinque folii folio subtus argenteo. just.

A. alpina pubescens minor. D. Vaillant.

A. minima montana fabii Columnæ

A. supina graminæo folio minore flore. just.

A. Linariæ folio Calice florum albo. just.

Cuscuta minor just.

Ricinus humilis foliis subrotundis serratis et subtus argenteis flore et fructu glomeratis. Houston

R. vulgaris. C. B.

R. africanus maximus Caule geniculato rutilante. Vaillant

R. americanus totus ruber. [illegible]

Ricinoides gossypii folio. just.

R. arbor americana Staphisagriæ folio. just.

Manihot americana spinosissima folio vitigineo. Plumerii.

Lupuloides americana scandens Capreolis donata.

Lupulus fœmina. J. B.

Urtica urens maxima. C. B.

U. urens minor. C. B.

U. maxima racemosa Canadensis. Vaillant.

U. urens pillulas ferens prima dioscoridis fœmina. Lini.

U. foliis profunde laciniatis semine Lini. ammanni.

U. racemifera maxima Sinarum folio subtus argentea, Lanugine villosis. Pluk.

U. racemosa americana amplo Corylifolio. Plumerii

U. Canadensis foliis lucidis.

major racemosa humilior [illegible]

Parietaria officinarum et Dioscoridis. C. B.
foliis dentatis caulibus diffusis coloribus [illegible]
P. herniariæ facie. Plum.
Equisetum arvense longioribus setis. C. B.
E. palustre longioribus setis. C. B.
Persicaria minor. C. B.
P. orientalis nicotianæ folio calice florum purpureo Cor. juss.
P. sinensis floribus laxe spicatis
P. mitis maculosa floribus purpurascentibus. C. B.
P. frutescens maculosa virginiana flore albo. Park.
P. montana latifolia major floribus racemosis Sigisbeckii
P. salicis folio potamogeton angustifolium dicta. Raji
Fagopyrum scandens claviculis donatum
F. vulgare erectum. juss.
F. erectum fructu aspero. Ammanni.
F. vulgare scandens. juss.
F. marianum folio sagittato caulibus et pediculis spiniferis. Petiverii.
Bistorta major radice magis intorta. C. B.
B. alpina maxima. C. B.
B. alpina minor. C. B.
Lacrima job. Clusii.
L. job altissima arundinis folio et facie. Plumerii.
Maïs granis aureis. juss.
Milium arundinaceum subrotundo semine nigricante sorgo nominatum. C. B.
M. arundinaceum subrotundo semine luteo sorgo nominatum. C. B.

3 M. Arundinaceum plano alboque Semine. C. B.
× M. arundinaceum indicum Seu dora Semine nigro. just.
4 M. arundinaceum Scandens et maculosum. Plumerii
5 M. judicum panicula Sparsa erecta. just.
6 M. judicum minus panicula Sparsa erecta
7 M. Semine albo. C. B.

Panicum vulgare. J. B.
P. maritimum Spica longiore villosa. just.
P. vulgare Spica Simplici et molliori just.
P. vulgare Spica Simplici et aspera. just.
× P. vulgare Spica multiplici longis aristis circumvallata just.
P. judicum Spica obtusa Coerulea. C. B.

Elymus Spica flaccido pendula. Linn. h. Upsal.
E. aristis Spicula longioribus. Linn. h. Ups.

hordeum murinum. J. B.
h. Distichum. J. B.
h. Polystichum hybernum. C. B.

Secale hybernum vel majus. C. B.

Triticum quod hordeum distichum Spica nitida Zea Seu Briza nuncupatum. just.
4 T. trimestre. moris.
2 T. hybernum aristis Carens. C. B.
3 T. Latifolium glumis Crassioribus Seu Spelta major

Avena vulgaris Seu alba. C. B.
× A. fragilis. Linnaei.
2 A. Sylvestris pilosa aristis. moriss.

Arundo Sylvatica elatior panicula molli Candida et cericinodo lucens moriss.

A. vulgaris sive phragmites Dioscoridis . C. B.
A. sativa quæ donax Dioscoridis et theophrasti
A. judica variegata sive laconica theophrasti
A. saccarifera . C. B.
A. arbor ex qua humor lacteus gignitur qui tabaxi avicene et arabibus dicitur . C. B.

Vingt deuxieme Leçon

1 Cyperus. vulgatior panicula sparsa. inst.
x C. odoratus radice longâ sive cyperus officinarum C. B.
2 C. rotundus esculentus latifolius
3 C. rotundus esculentus angustifolius . C. B.
x C. minimus paniculâ sparsâ sub flavescente inst.
4 C. gramineus. J. B.
1 Cyperoides spicis parvis longa distantibus inst.
x C. nigro luteum vernum minus inst.
2 C. latifolius spica rufa sive caule triangulo. inst.
3 C. sylvarum tenuius spicatum . inst.
x C. spicâ pendula breviore inst.
4 C. polystachion lanuginosum . inst.
Scirpoides quod gramen cyperoides palustre majus spica compacta . C. B.
Scirpus palustris altissimus . inst.
2 S. equiseti capitulo majori . inst.
x S. equiseti capitulo minori . inst.
3 S. maritimus capitulis rotundioribus conglomeratis institutionum .
4 [illegible] capitulo longiori

6 S. americanus caule geniculato cavo. D. Lignon
3 S. omnium minimus capitulo breviori. just.
Melanoschænos palustris angusti folius junci facie lithospermi semine micheli
x Linagrostis panicula ampliore. just.
x Typha palustris major. C. B.
2 Gramen spicatum instar limæ dentatum Cupani. horti Catholici.
G. nodosum spicâ parvâ sive nodosum tertium C. B.
1 G. Typhoides maximum spica longissima. C. B.
3 G. spicatum spicâ cilindraceâ tenuissimâ longiore just.
G. spicatum spica cilindracea longioribus villis donata. just.
4 G. Lolilaceum angustiore folio et spicâ. C. B.
G. paniculatum bromoides minus paniculis aristatis unam partem spectantibus. Raji
5 G. Lolilaceum radice repente sive gramen offi. just.
6 G. angusti folium spica tritici mutica simili. C. B.
7 G. Lolilaceum quod spartium spicatum pungens oceanicum. J. B.
8 G. spicatum quod spartum plinii.
G. Lolilaceum fibrata radice aristis donatum just.
9 G. spicatum secalinum maritimum spica breviore just.
10 G. avenaceum dumetorum paniculâ sparsa. Raji
11 G. Lolilaceum corniculatum spicis villosis. just.
12 G. quod festuca pratensis lanuginosa. C. B.
13 G. avenaceum paniculâ densa locustis majoribus

aristatis. just.

14 G. phalaroides majus acerosâ erectâ parvâ paniculâ

G. anthroxanthon Spicatum. J. B.

G. avenaceum Locustis villosis Crassioribus just.

15 G. Pratense paniculatum majus angustiore folio C. B.

16 G. alpinum paniculatum narcissi folio.

17 G. Pratense paniculatum altissimum locustis parvis Splendentibus non aristatis. just.

18 G. murorum Spica longissima Gerardi

19 G. Paniculatum radice repente culmo Compresso. Vaillant

20 G. avenaceum pratense elatius panicula flavescente locustis parvis. Raji

21 G. Paniculis elegantissimis. minimum. just.

22 G. Paniculis elegantissimis Sive eragrostis majus C. B.

23 G. tremulum maximum. C. B.

24 G. tremulum majus C. B.

25 G. maderaspatanum Spica interrupta totalè e pluribus Spicis parvis villosis elegantissime contructa. Pluk.

26 G. Pratense panicula duriore laxa unam Præcipue partem Spectante. Raji.

27 G. Paniculatum arvense minimum. Buxbaum

G. montanum Paniculâ Spadiceâ delicatiore C. B.

28 G. Caninum Supinum minus. C. B.

29 G. avenaceum montanum Spicâ Simplici aristis recurvis. Raji

G. orientale paniculatum Portulacæ Semine Cor. just

G. Pratense paniculatum minus album. C. B.

G. Paniculatum Latifolium Locustis crassioribus semine nigro aquilegiæ Simili. just.

G. Spicatum folio aspero. C. B.

G. alopecuros minus Spicâ Longiore. C. B.

G. alopecuroides Spica rotundiore. C. B.

G. Pratense paniculatum molle. C. B.

G. Spicatum Semine militaceo albo. just.

G. Spicatum Semine militaceo nigro. just.

G. nodosum avenaicâ Paniculâ C. B.

G. arundinaceum Canadense minus

G. arundinaceum acerosa glumâ nostras Park

G. Paniculatum folio variegato. C. B.

G. minus volgare Paniculâ rigidâ. just.

G. Capillatum Paniculis rubentibus. J. B.

G. junceum Dalechampii

G. Spica Cristata Sub hirsutum. C. B.

G. Spicatum aristis pinnatis. just.

G. avenaceum Locustis rubris montanum. C. B.

G. avenaceum montanum Lanuginosum. C. B.

G. avenaceum Lanuginosum glumis rarioribus C. B.

G. Spicatum Locustis echinatis. just.

G. Capillaceum Locustellis pennatis non aristatis Raji

G. americanum Spicâ echinatâ majoribus locustis Schola Botanicæ.

G. Spicatum durioribus et crassioribus Locustis Spica brevi. just.

50 G. Spicatum durioribus et crassioribus locustis spicâ longissimâ. just.

G. americanum spicatum glumis perforatis

51 G. alopecuroides spica aspera. C. B.

52 G. arvense polypodii paniculâ crassiore. Barlerii

53 G. Dactylon Egyptiacum. C. B.

54 G. judicum aromaticum paniculatum vitriculis villosis sive Scœnanthus india orientalis

55 G. Dactylon maximum americanum Pluk.

G. Paniceum dicta chryophorum sive spicâ gemellâ binis granorum ordinibus uno versu constante judiæ orientalis Pluk.

56 G. Dactylon orientale frumentaceum semine rapi Raji

57 G. Dactylon angustifolium spicis villosis. just.

58 G. Dactylon villosum ramosum altissimum. Gallo provinciale. just.

G. Dactylon folio latiore. C. B.

59 G. dactylon indicum spicis longioribus. just.

60 G. Dactylon radice repente sive officinarum. just.

Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis. C. B.

F. non ramosa dentata. C. B.

F. baccifera Cornuti

F. minor non ramosa. J. B.

Lonchitis auriculata major. just.

Osmunda vulgaris et palustris. just.

O. mariana Dryopteris folio.

O. judica Polypodii folio.

Polypodium angustifolium folio vario Just.
P. vulgare. C.B.
Filicula fontana major sive adiantum album filicis folio. C.B.
F. quæ adiantum nigrum offici. pinnulis obtusioribus Just.
F. Lusitanica Polypodii radice. Just.
Adiantum foliis Coriandri. C.B.
A. americanum. Cornuti.
Asplenium sive Ceterac. J.B.
Trichomanes sive Polytricum offici. C.B.
Ruta muraria. C.B.
Lingua Cervina angustifolia lucido folio serrato. D. Vaillant
L. Cervina maxima undulato folio auriculato per basim. D. Vaillant. h.R.P.
L. Cervina officinarum. C.B.
Ophioglossum vulgatum. C.B.
Bryonia aspera sive alba baccis rubris. C.B.
B. Canadensis folio angulato fructu nigro. Just.
B. africana glabra foliis in profundas Lacinias divisis flore luteo. Oldenlandi.
Sicyoides americana fructu echinato foliis angulatis. Just.
Momordica vulgaris. Just.
M. zeylanica Pampineâ fronde fructu longiori Just.
M. fructu striato levi. Feuillee
Luffa arabum seu Cucumis reticulatus Egyptius

Cucurbita Lagenaria. J. B.
Pepo vulgaris. Raji
Melopepo Compressus. C. B.
M. Pepo Clypei formis. C. B.
M. Pepo Citri formi. just.
× M. Pepo viridis oblongus major
Anguria Citrullus dicta. C. B.
A. americana fructu echinato eduli just.
Colocynthis fructu rotundo major. C. B.
Melo vulgaris. C. B.
M. rotundus parvus. C. B.
Cucumis vulgaris maturo fructu Sub luteo C. B.
C. flexuosus. C. B.
C. americanus minor
Elaterium Sive cucumis Sylvestris asininus dictus. C. B.
hepatica Secunda Tabernæ.

Vingtroisieme Leçon

Abies taxi folio fructu Sursum Spectante. just
A. taxi foliis odore balsami Gileadensis Raji.
A. Piceæ foliis brevibus Conis minimis. D. Rand.
A. Piceæ foliis brevioribus Conis parvis biunciatibus Laxis. D. Rand.
A. tenuiore folio fructu deorsum inflexo. just.
Pinus Sativa. C. B.
P. maritima minor. C. B.
P. Sylvestris. C. B.

L. americana quinis ex uno folliculo setis longis-
tenuibus triquetris ad unum angulum per totam
longitudinem minutissimis crenis asperatis. Pluk.
Larix orientalis fructu rotundiore obtuso. Just.
L. folio deciduo conifera. J. B.
Cupressus ramos extra se spargens quae mas
Plinii. Just.
C. metâ in fastigium convoluta quae foemina. Plinii
Just.
C. virginiana foliis acaciae deciduis. Commelini
Thuya ramis erectis
T. Theophrasti. C. B.
Alnus rotundifolia glutinosa viridis. C. B.
Betula julifera fructu conoide viminibus
lentis.
B. Canadensis latiore folio hirsuto
B. Dodonaei.
Quercus cum longo pediculo. C. B.
Q. latifolia mas quae brevi pediculo est. C. B.
Q. Caroliniensis virentibus venis muricata. Catesbi
Q. vulgo Burgundiaca calice hispido. C. B.
Ilex folio agrifolii. Botanici Monspeliensis
I. folio angusto non serrato. C. B.
I. oblongo serrato folio. C. B.
I. americana folio non serrato in summitate
quasi triangulo.
I. aculeata cocci glandifera. C. B.
Suber latifolium perpetuo virens. C. B.
Nux americana fructu parvo olivae formi.

N. juglans americana Nuce latâ Compressâ.

N. juglans alba virginiensis Park.

N. juglans virginiana nigra fructu oblongo profundissime insculpto. D. Rand.

N. juglans virginiana nigra. h. lug. Bat.

N. juglans fructu serotino. C. B.

N. juglans sive regia vulgaris

Corylus sativa fructu rotundo maximo. C. B.

C. sativa fructu albo minore sive vulgaris

C. sativa fructu oblongo rubente albâ Paniculâ tecto.

C. sylvestris. C. B.

Carpinus orientalis folio minore fructu brevi. Cor. inst.

C. seu Ostrya ulmo similis fructu racemoso lupulo simili

C. Dodonei

Castanea sylvestris quæ peculiariter Castanea.

C. sativa. C. B.

Taxus. J. B.

Fagus. Dodonei

Morus fructu albo minori ex albo purpurascente inst.

M. fructu nigro. C. B.

M. fructu albo. C. B.

M. fructu viridi ligno sulphureo tinctorio Sloanei

Juniperus vulgaris fruticosa. C. B.

J. virginiana. h. lug. B.

J. Bermudiana . h. lug. B.
J. major Bacca rufescente . C. B.
J. foliis inferioribus juniperum, superioribus Sabinam aut Cupressum referentibus . Boerh.
Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente
Sabina folio Cupressi . C. B.
Liquidambar. C. B.
L. orientale
Chamaelea tricoccos . C. B.
Ptelea . h. Clif.
Molle monardi
Buxus foliis rotundioribus . C. B.
B. arborescens . C. B.
B. foliis ex luteo variegatis . h. R. P.
Gale africana foliis sinuatis quercus figurâ
G. americana fructu Coriandri racemoso.
Lerota subspinosa foliolis minoribus per pinnas marginato alatas dispositis, spicis geminatis alaribus Brourune.
L. foliis pinnatis foliolis oblongis petiolo marginato juermi
Zanthoxilum canadense foliis pinnatis floribus fasciculatis per ramos sparsis singulis brevi pedicula incidentibus.
Rhamnoides fructifera foliis salicis baccis leviter flavescentibus . Cor. inst.
R. florifera salicis foliis . Cor . inst.
Terebinthus seu Pistacia latifolia . inst.
T. peregrina fructu minore et Coeruleo Eduli . C. B.

T. vulgaris. C. B.
T. judica theophrasti Sitacia dioscoridis lobelijque
T. Capadocia. h. R. P.
T. folio angustiore crispo.
T. minor
T. major Sitaciæ folio Lobelii
Lentiscus vulgaris. C. B.
Salix orientalis flagellis deorsum Sulchre-
Pendentibus. Cor. just.
S. vulgaris alba arborescens. C. B.
S. Sativa lutea folio crenato C. B.
S. Caprea acuto Longo que folio. Raji
S. folio ex rotunditate acuminato. C. B.
S. Latifolia rotunda. C. B.
S. pumila folio rotundo. J. B.
S. Pumila angustifolia inferne lanuginosa J. B.
S. humilior foliis angustis Sub coeruleis ex adverso
binis. Raji
Populus alba majoribus foliis
P. nigra. C. B.
P. nigra foliis oblongis
P. tremula. C. B.
Platanus orientalis aceri folio. Cor. just.
P. occidentalis aut virginicensis Park.
P. orientalis verus Park.
Tamariscus germanica Lobelii.
T. Narbonensis lobelii
Thymelæa. lauri folio deciduo Sive laureola
fœmina. just.

T. Lauri folio semper virens seu laureola mas just
T. folio lini. C. B.
T. foliis candicantibus serici instar mollibus C. B.
Rhamnus catharticus. C. B.
R. catharticus minor C. B.
R. hispanicus buxi folio minor. just.
R. hispanicus buxi folio ampliore. just.
R. creticus buxi folio minori. Cor. just.
R. afer folio pruni longiori subrotundo flore candicante spinis longissimis. Boerh.
R. afer folio pruni longiore et angustiore
Alaternus monspeliaca foliis profundius incisis h. R. P.
A. aurea seu foliis ex luteo variegatis. h. R. P.
A. prima clusii
A. minore folio. just.
Alaternoides africana lauri serratae folio. Commelini.
A. africana ericae foliis floribus albicantibus et muscosis. Commelini
Frangula Dodonei.
F. rugosiore et ampliore folio
F. rugosiore et ampliore folio minor
Wolkameria ramis spinosis h. Upsaliensis
W. ramis inermibus. Linn.
Nerion floribus rubescentibus. C. B.
N. indicum angustifolium floribus odoratis simplicibus h. Lug. Bat.
Phillyrea latifolia spinosa. C. B.

P. folio Ligustri. C. B.
P. hispanica nerii folio jus.
P. Latifolia Levis. C. B.
P. angustifolia prima. C. B.

Ligustrum. C. B.

L. Capense Semper virens folio Crasso Subrotundo h. Elthamensis.

Vingtquatrieme Leçon

Olea Sativa C. B.
O. Sylvestris folio duro Subtus incano. C. B.
O. afra folio Buxi crasso atro viridi lucido Cortice albo Scabro. Boerh.

Jasminum hispanicum flore majore externe rubente. J. B.
J. vulgatius flore albo. C. B.
J. azoricum flore albo viridi Lusitanici
J. Sive gelseminum luteum. J. B.
J. luteum vulgo dictum baciferum. C. B.
J. flavum odoratum. S. Vaillant. h. R. P.
J. Sive Sambach arabum alpino J. B.

Laurus Latifolia Dioscoridis. C. B.
L. vulgaris folio undulato mas. Boerh.
L. tenui folia mas Boerh. judici
L. quæ persea clusii
L. judica. aldini h. farnesiani
L. foliis enervibus versa ovatis utrinque acutis integris annuis. Linn h. Clif.
L. Camphorifera Engelberti. Kæmpferi

2 Arbutus folio serrato. C. B.

1 Styrax folio mali Cotonei

Elæagnus Orientalis angusti folius fructu parvo olivæ formi subdulci. Cor. inst.

Aquifolium Carolinianum angusti folium spinis raris brevissimis. Millerii

A. sive agrifolium vulgo. j. B.

A. foliis oblongis spinis et limbis aureis

A. echinata foliis superficie. Cornuti

Guaiacana. j. B.

G. Pishamin virginianum Park.

G. angustiore folio. Inst.

Ulmus folio latissimo scabro. Gerardi

U. Campestris et theophrasti. C. B.

Ficus lauri effigie fructu minimo

F. Sylvestris procumbens folio simplici

F. americana folio citri obtuso fructu sanguineo. Plumerii

F. alia foliis lauri fructu minori Plumerii

F. Bengalensis folio subrotundo fructu orbiculato. h. amstelodamensis

F. malabarensis folio cuspidato fructu rotundo parvo gemino Pluk

F. indica foliis mali Coloneæ similibus fructu ficubus simili. C. B.

F. Communis. C. B.

Sambucus fructu in umbella nigro. C. B.

S. fructu in umbella viridi. C. B.

S. racemosa rubra. C. B.

S. Laciniato folio. C. B.
S. humilis sive ebulus. C. B.
Opulus flore globoso. just.
O. Ruellii
Viburnum Canadense tini foliis late virentib[us]
Saraceni.
V. Mathioli
V. foliis ovatis serratis
V. americanum Phyllireæ foliis.
Tinus prior clusii
Callicarpa act. acad. Upsaliensis Linnæi
× Oxycoccus sive vaccinia palustris. j. B.
Vitis jdæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante. C. B. Uva ursi clusii
Myrsine Linnæi h. Clif.
Royena foliis ovatis Linnæi h. Clif.
R. foliis lanceolatis hirsutis Van Royen
Caprifolium germanicum Dodonei
C. jtalicum Dodonei.
C. Canadense flore parvo.
Periclymenum perfoliatum virginianum semper virens et florens hermanni
Xylosteon Canadense fructu rubro.
X. Pyrenaicum. just.
Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro. C. B.
C. montana fructu singulari cæruleo. C. B.
C. alpina fructu rubro gemineo duobus punctis notato C. B.

C. alpina fructu nigro gemino. C. B.

Diervilla acadiensis fruticosa flore luteo. act. acad. R. P.

Symphoricarpos foliis alatis. Dill. h. Elth.

Cephalanthus foliis oppositis Van Royen

Coffea Linnaei h. Clif.

Lilac. mathioli

L. ligustri folio. jus.

L. laciniato folio. jus.

Vitex foliis angustioribus cannabis modo dispositis C. B.

V. negundo foliis quinatis ternatis que serratis floribus racemoso paniculatis. Linnaei specierum.

V. sive agnus minor foliis angustissimis. D. Vaillant

V. trifolia minor. C. B.

Thulipifera arbor virginiana. hermanni

halleria Linnaei h. Clif.

Rhus folio ulmi. C. B.

R. canadense foliis longiori utrinque glabro. jus.

R. canadense folio minore serrato flore virescente

R. virginianum. C. B.

R. egyptiacum trifolium laciniatum. D. Granger

R. africanum trifoliatum majus glabrum splendente utrinque folio subrotundo medio quando que crenato boerh.

R. africanum trifolium angustissimo folio subtus incano seu agni casti lobis. hermanni.

Toxicodendron carolinianum foliis pinnatis floribus minimis herbaceis. Millerii

T. trifillum folio minus sinuato.

T. trifillum glabrum. just.
T. trifillum folio sinuato pubescente. just.
Cotinus coriaria Dodonei.
Grewia corollis acutis Linn.
G. corollis obtusis Linn.
G. foliis angulatis flore albo.
Tilia foemina flore majore. C. B.
Celtis fructu nigricante. just.
C. fructu obscure purpurascente. just.
C. orientalis minor foliis minoribus et crassioribus fructu flavo. Cor. just.
Hedera foliis variegatis
H. arborea. C. B.
Vitis virginiana Laciniata Petroselini folio
V. trifolia minor uva Corymbosa acinis majoribus turbinatis Plumerii
V. quinque folia Canadensis scandens. just.
V. vinifera. C. B.
V. abutili folio acinis atro purpureis. Plumerii
V. virginiana Sylvestris. Park.
V. virginiana alba foliis profunde divisis
V. Laciniatis foliis. Cornuti.
V. canadensis aceris folio. just.
Berberis dumetorum. C. B.
B. latissimo folio Canadensis. D. Vaillant.
B. alpina Cretica. C. B.
Erica vulgaris glabra C. B.
E. tenui folia flosculis suave rubellis Pluknetii.
Rubus odoratus. Cornuti.

R. laciniatis foliis.
R. montanus repens sarmentis rotundis spinis minutissimis munitis foliis rotundis utrinque lanatis superne cinereis inferne candicantibus, flore albo fructu nigro parvo. Micheli.
R. vulgaris sive rubus fructu nigro. C. B.
R. flore albo pleno magnolii.
R. Canadensis trifolius non spinosus scandens
R. repens fructu coesio. C. B.
R. flore albo. Magnolii
R. vulgaris spinis carens. B. Vaillant.
2 R. alpinus humilis. J. B.
1 R. idaeus spinosus. C. B.

Acer montanum candidum. C. B.
A. Platanoides. Muntingii
A. campestre et minus. C. B.
A. virginianum folio majore subtus argenteo supra viridi splendente. Pluk.
A. Canadense folio tridentato amplissima. Sarazeni
A. trifolia. C. B.
A. Cretica Prosperi alpini
A. maximum foliis trifidis vel quinquefidis virginianum Pluk.
A. Canadense folio tripartito ampliori.

Staphilodendron mathioli
S. virginianum trifillum. jurk.

Vingt cinquieme Leçon

Fraxinus excelsior. C. B.

S. ex novâ anglia primis foliorum in mucronem productioribus millerii. h. Catalogi.

S. Caroliniana Latiori fructu. millerii

S. humilior sive altera Theophrasti minore et tenuiore folio. C. B.

S. florifera Botryoides. morin.

Maurocenia Linnæi

Evonimus virginianus Pyracanthæ foliis capsula verrucarum instar asperata rubente. Pluk.

E. Æthyopicus Pyracanthæ folio fructu majore Pluk.

E. vulgaris granis rubentibus

E. latifolius. C. B.

Evonymoides Canariensis Scandens folio ovato non serrato

E. Canadensis Scandens foliis serratis act. Acad. R. S.

Syringa alba sive philadelphus athenæi C. B.

Spiræa opulifolio. jus.

S. hyperici folio non crenato. jus.

S. hispanica hyperici folio crenato. jus.

S. Salicis folio. jus.

S. americana Salicis folio flore spicato albo

Azedarach Dodonei

A. semper virens et florens. jus.

Aurantium olyssipponense ferrarii

A. acri medullâ vulgare. ferrarii.

A. Sylvestre medulla acri. jus.

A. fructu violaceo

A. fructu multiplici. jus.

A. virgatum angusti folium. jus.

A. A virgatum. ferrarii.
a. folio angustissimo Lanceolato. just.
a. foliis Latissimis fructu rotundo maximo lutescente
a. maximum ferrarii
a. folio et fructu maximis Sinense
a. fructu suavissimo bergamium dicto
Citreum vulgare. just.
C. fructu turbinato odoratissimo
C. magno fructu just.
C. fructu rotundo
Limon dulci medulla vulgaris ferrarii.
L. fructu odoratissimo
Prunus flore pleno. h. R. P.
P. virginiana fructu parvo Cerasi.
P. sylvestris. C. B.
P. fructu ovato maximo flavo. just.
P. myrobalanus dicta. j. B.
P. fructu magno dulci atro cæruleo
P. fructu majori virescente suavissimo
P. sine nucleo
Armeniaca fructu majore nucleo amaro
A. fructu minori glabro aureo nucleo dulci. just.
Persica molli carne et vulgaris viridis et alba. C. B.
P. africana nana flore incarnato simplici just.
Cerasus sylvestris amara Mahaleb putata j. B.
C. racemosa sylvestris fructu nigro non Eduli
C. similis Canadensis oblongo angusto folio fructu parvo

C. Sativa fructu rotundo rubro et acido. just.

C. racemosa Sylvestris fructu non Eduli. C. B.

C. Pumila. just.

C. Sylvestris fructu nigro

C. major ac Sylvestris multiplici flore

C. major fructu magno Cordato. Raji

Amygdalus dulcis. J. B.

A. amara. J. B.

A. indica nana. H. R. P.

A. flore pleno minor.

A. orientalis foliis inanis.

Ziziphus americana inermis folio subrotundo dentato.

Z. inermis folio latiore hirsuto

Z. inermis Scandens foliis venosis fructu parvo ovato oblongo biloculari.

Z. Sinensis longiore folio et angustiore

Z. americanus ampliore folio et Spinis validioribus

Z. Dodonei.

Paliurus americana inermis

P. Dodonei.

Laurocerasus clusii

L. Cerasus lusitanica minor just.

L. Cerasus americana

Malus Sylvestris acido fructu albo. just.

M. fructifera fugaci flore. H. R. P.

M. Sativa fructu magno dilute rubente et inodoro

M. Sativa fructu Subrotundo e viridi Palescente acido dulci. just.

Pirus sativa fructu autumnali subrotundo è fer=rugineo rubente non unquam maculato. Inst.

P. sylvestris. C. B.

P. sativa fructu hiemali magno pyramidato e flavo non nihil rubente. Inst.

P. sativa fructu autumnali suavissimo in ore liquescente. Inst.

P. sativa fructu autumnali tuberoso sessili saccharato carne durâ. Inst.

Sorbus aucuparia. J. B.

S. sativa. C. B.

Cydonia angustifolia vulgaris. Inst.

Cratægus folio subrotundo serrato subtus incano. Inst.

C. virginiana foliis arbuti. Inst.

C. fructu nigro. D. Vaillant

C. Canadensis folio oblongo serrato fructu nigro

C. foliis amplioribus subtus incanis

Mespilus folio subrotundo fructu rubro Inst.

M. vulgaris. J. B.

M. sine nucleo

M. corni folio dentato

M. aculeata amygdali folio. Inst.

M. apii folio sylvestris spinosa sive oxyacantha C. B.

M. spinosa sive oxyacantha flore pleno

M. Canadensis sorbi torminalis facie. Inst.

M. apii folio laciniato. C. B.

Siliqua edulis. C. B.

Sapindus foliis costæ non alatæ innascentibus

S. foliis Corrae alatae innascentibus. Just.

Coriaria vulgaris. act. acad. R. P.

Bonduc vulgare majus Polyphyllum. Plum

B. Canadense Polyphyllum non Spinosum

Pavia Boerh

Hippocastanum vulgare Just.

Rosa arvensis candida. C. B.

R. Canina duplicato flore. Burdigalensis quorundam

R. inapertis floribus alabastro cramoxa frauco furtensi h. R. P.

R. pumila Spinosissima foliis pimpinellae glabris flore albo. J. B.

R. Spinis carens flore majore. C. B.

R. Sylvestris fructu majore hispido. Raji

R. cretica montana foliis Subrotundis glutinosis et villosis. Cor. Just.

R. alba vulgaris major. C. B.

R. flore albo pleno

R. multiplex media

R. maxima multiplex. C. B.

R. Moschata Simplici flore alba

R. moschata flore pleno. C. B.

R. omnium calendarum h. R. P.

R. omnium Calendarum flore pleno Carneo

R. odore Cinnamomi flore pleno. C. B.

R. rubra Simplex. C. B.

R. versi color. C. B.

R. rubra multiplex. C. B.

R. Sylvestris virginiana Park.

R. Lutea simplex. C. B.
R. Punicea. Cornuti
Myrtus Latifolia romana. C. B.
M. Baetica Latifolia Domestica. Clusii.
M. media Clusii
M. foliis minimis mucronatis. C. B.
M. foliis laurinis baccis e coeruleo nigris. Plum.
x M. Latifolia floribus purpureis Plumerii
M. arborescens Citri foliis glabris fructu racemoso
Caryophyllato sapore. Plum.
Guayava Clusii
Punica quae malum granatum fert. Caesalpini
P. americana nana seu humillima. Just.
Grossularia simplici acino spinosa fructu
majore rubente
G. spinosa sativa. C. B.
G. simplici acino vel spinosa sylvestris
G. multiplici acino sive non spinosa hortensis rubra
sive ribes officinarum. C. B.
G. non spinosa fructu nigro majore. C. B.
G. virginiana fructu oblongo rubente per maturitatem
nigricante
G. dulcis et sterilis
G. vulgaris fructu dulci
Cornus foliis Citri angustioribus Armeniaca
C. virginiana Latifolia humilior.
C. foemina. C. B.
C. sylvestris fructu albo.
C. hortensis mas. C. B.

C. hortensis mas fructu Ceræ colore. C. B.

Vingt sixieme Leçon

Draco arbor. Clusii.
D. humilis foliis longis Crassissimis
D. humilis guineensis folio latiore variegato
D. humillima Zeylanica angustifolia variegata
D. Caulescens Cannacori folio
Sebestena domestica. C. B.
Palma major. C. B.
P. Dactylifera fructu globoso minor Plumerii
P. japonica Spinosis pediculis polypodii folio Boerh
P. minor. C. B.
P. Caroliniana humilis radiata latifolia
Palmifolia fructu clavato Polypyreno
Rauvolfia tetraphylla Latifolia. Plumerii
R. tetraphylla angustifolia Plumerii
Tabernæ montana Lactescens Citri foliis
undulatis Plumerii.
Plumeria flore roseo odoratissimo. jun.
P. flore niveo foliis longis angustis et acuminatis. jor
P. flore niveo angustissimis foliis.
Camara trifolia purpurascente flore. Plum.
C. melissæ folio flore flavo. Dill.
C. Spinosa flore variegato. Plum.
C. Spinosa floribus Coccineis
C. arborescens Salviæ folio Plumerii
C. arborescens Salviæ folio Sub incano
C. folio parvo orbiculato floribus et baccis foliolis interceptis

C. foliis alternis floribus albis solitariis
Cornutia flore pyramidato coeruleo foliis incanis Plumerii
C. foliis oblongis ad basim aculeatis flore albo
Bontia arborescens Thimeleae facie Plum.
Pereskia aculeata flore albo fructu flavescente Plumerii.
P. arborescens spinosissima fructu ficii formâ
Guazuma arbor Ulmi folia fructu ex purpureo nigro Plum.
G. foliis amplissimis petalis integris.
G. frutex chamaedrys folia fructu lanuginoso minor. Plumerii.
Guanabanus fructu e viridi lactescente molliter aculeato. Plumerii.
G. fructu purpureo. Plum.
Sapota fructu turbinato minori. Plum.
Sideroxylon inerme. Linnaei. h. Clif.
S. spinosum. Linn. h. Clif.
Malpighia Cidoniae foliis minoribus.
M. malipunici facie plumerii
M. Latifolia folio subtus spinoso. Plum.
M. angustis et acuminatis aqui folii foliis Plum.
Ellisia acuta. Linnaei
E. inermis
Papaya fructu melopeponis effigie. Plum.
P. ramosa fructu piri formi. feuillet.
hura americana abutili indici folio. h. amst.
Guiabara oviedo

G. alia racemosa foliis oblongis. Plumerii.
Adansonia digitata. Linn. Specierum
Randia major latiore folio binis aculeis, a ramulorum fastigio, ex hujus ligno sagittas, e fructibus atramentum conficiunt indigenæ.
R. minor foliis oblongis ex opposito binis
Citharexylon americanum alterum foliis ad marginem dentatis. Pluk.
C. arbor laurifolia americana foliorum venis late candicantibus, ex cujus ligno citharæ et panduræ fiunt. Pluk.
Dodonea. Linn. h. clif.
Clutia. Boerhavii judici et Linnæi
C. Telephii legitimi folio frutescens.
Niruri. h. malabarici
N. seu urinaria indica erecta vulgaris
Pseudobrasilium Plumerii.
Trucu. brasiliensibus Margravii
Coletta Wetla. h. malabarici
Sabago belgarum sive peplis parisiensium Dalecampii.
S. capensis frutescens major. Dill.
S. africana frutescens portulacæ foliis morgsani syrorum ex brevi pediculo binis. Pluk.
S. Ægyptia folio bidigitato tereti. Vaillant.
Ximenia ægyptiaca sive agihalod
Glans unguentaria. C.B.
G. sive moringo. acostæ.
Guaiacum flore cœruleo fructu subrotundo. Plum.

G. flore Coeruleo fimbriato fructu tetragono. Plum.

Bauhinia non aculeata folio ampliori et bicorni. Plum.

B. foliis cordato sub rotundis laciniis rotundatis. Linn. h. Clif.

B. inermis foliis cordatis semibifidis laciniis acuminato ovatis dehiscentibus. Linnæi

Cassia exaphylla siliqua bicapsulari. Plum.

C. fetida foliis senne. Plum.

C. americana fœtida foliis oblongis glabris. Jus.

C. marylandica pinnis foliorum obtusis radice repente. Millerii

C. minima arborescens siliquis longis et angustis Plumerii.

C. fistula alexandrina. C. B.

C. foliis pseudo acaciæ. Feuillet.

C. humilis siliquis fœnu græci. Plum.

Senna italica sive foliis obtusis. C. B.

Poinciana flore pulcherrimo. Jus.

Cœsalpina polyphylla aculeis horrida Plumerii.

Tamarindus Raji historia.

Accacia indica farnesiana aldini.

A. indicæ similis foliis minimis

A. cornuta indiæ occidentalis. Sebæ.

A. foliis lentisci semper virens spinis vidua h. oxon.

A. americana abruæ foliis triacanthos sive ad axillas foliorum spinâ triplici donatâ. Pluk.

A. americana non spinosa abruæ foliis.

A. non Spinosa Siliquis latis Compressis flore albo Plumerii.
A. validissimis et longissimis aculeis albicantibus munita flore lutteo juss.
A. americana non Spinosa frutescens mimosæ majoris folio
A. non Spinosa indiæ orientalis foliis Subtus Cæsiis floribus globosis luteis Pluk.
A. inermis foliorum pinnis angustissimis.
A. malabarica altera Spinis Carens Commelini
A. Peruana Spinosa fructu medicæ tornatæ longiori
A. Peruviana maritima Spinosa Siliqua dulci Eduli
A. aculeata floribus Spicatis tegumine Compresso
A. maderaspatana foliolis parvis aculeis e regione binis Prægrandibus horrida Cortice Cinereo Pluk
A. Peruviana Spinosa minor foliis glaucis
A. americana Singularibus Spinis ad axillas foliorum
A. foliis amplioribus Siliquis Circinnatis. Plumerii
A. foliis amplioribus Siliquis compressis flore Coccineo Plum.
A. non Spinosa indiæ orientalis foliis per exiguis virgulis lanugine ferruginea villosis. Pluk.

Mimosa humilis frutescens et Spinosa Siliquis conglobatis. Plum.
M. Spuria Pernambucana
M. Spinosa foliis acaciæ angustioribus

Pisonia aculeata fructu glutinoso et racemoso Plumerii.

Topiaria americana frutescens

C. horti Regii Parisiensis.

Cordia nucis juglandis folio flore purpureo Plumerii.

C. foliis subovatis longius petiolatis.

Cinchona foliis subrotundis ad oras crispis

Cujete foliis oblongis et angustis magno fructu ovato. Plum.

Diosma foliis linearibus acutis glabris subtus bifariam punctatis. Linnaei.

Dayena inermis. B. jussieu.

D. spinosa

Ceiba viticis folio caudice aculeato Plum.

C. viticis folio caudice glabro. Plum.

Hydrangea. gronovii.

Leucoxylum foliis laurinis alternis acuminatis fructu minore. Burmanni.

Monbin arbor foliis fraxini fructu luteo racemoso. Plumerii.

Cedrela foliis majoribus pinnatis floribus laxe racemosis ligno levi odorato

C. foliis pinnatis floribus sparsis ligno graviori

Benzonium indiae orientalis

Eugenia foliis integerrimis pedunculis unifloris lateralibus

Samyda Linnaei specierum

Xanthoxylum aculeatum carpini foliis americanum cortice cinereo. Pluk.

Milleria persicae folio trinervi

M. annua erecta floribus spicatis luteis. Martyngenii

Ludwigia capsulis oblongis. Linn. h. clif.
Proboscidea flore Sesami
Glinus. Linn. Specierum
Kiggelaria. Linn. h. clif.
Muntingia folio Ulmi aspero fructu minimo
glomerato. Plum.
hamelia racemis patentibus.

vingt septieme Leçon

Kæmferia. Linnæi h. clif
Maranta arundinacea Cannacori folio
Plumerii.
Cannacorus Latifolius vulgaris. jun.
C. flore luteo punctato jun.
C. amplissimo folio flore rutilo.
C. Glaucophyllos ampliore flore jridis palustris fere
h. Elthamensis
C Curcuma Linnæi
Zingiber C. B.
Z. Latifolium Sylvestre h. Lug. B.
Musa fructu cucumerino longiori Plumerii
M. fructu cucumerino breviori. Plum.
Ananas aculeata. J. B.
Karatas foliis angustissimis et aculeatis Plum.
Aloe vera major Muntingii.
A. Purpurea Levis Muntingii
A. vulgaris
A Succotrina angustifolia Spinosa flore purpureo. Breynii
A. africana Caulescens foliis Spinosis maculis abutraque

parte albicantibus notatis. h. amst.

A. africana maculata spinosa major.

A. africana caulescens spinosa foliis minus crassis maculatis. D. jussieu

A. africana foliis oblongis latioribus foliorum parte internâ vel externâ non nihil spinosa

A. africana caulescens foliis glaucis brevioribus caulem amplectantibus foliorum parte internâ et externâ non nihil spinosa. Commelini.

A. africana caulescens foliis glaucis brevissimis foliorum summitate interna et externâ non nihil spinosa. Commelini.

A. africana caulescens foliis minus glaucis caulem amplectantibus dorsi parte supremâ spinosâ. Comm.

A. africana mitraeformis spinosa. h. Elth.

A. africana mitrae formis foliis ad basim angustioribus

A. africana caulescens foliis glaucis caulem amplectentibus latioribus et undiquaque spinosis. Commelini.

A. africana caulescens foliis glaucis caulem amplectentibus Commelini

A. africana humilis spinis inermibus et verrucis obsita Commelini

A. africana brevissimo crassissimo que folio flore sub viridi. Commelini

A. africana folio in summitate triangulari margaritifera flore sub viridi h. Elth.

A. africana margaritifera minor h. ~~Amst~~ elodanius

A. africana humilis arachnoidea Commelini

A. africana minima atro viridis spinis herbaceis

numerosis ornata. Boerh.

A. africana erecta triangularis et triangulari folio viscoso. Commelini.

A. africana erecta rotunda folio parvo et in acumen rigidissimum exeunte. Commelini.

A. africana humilis foliis ex albo et viridi variegatis Commelini

A. africana arborescens montana non spinosa folio longissimo plicatili flore rubro Commelini.

A. africana flore rubro folio maculis abutraque parte albicantibus notato. Commelini.

A. africana foliis planis conjugatis carinatis verrucosis caule et flore corallii coloris. Boerhavii

A. africana foliis longis conjugatis supra cavis margaritiferis flore rubro elegantissimo. Boerh.

A. africana flore rubro folio triangulari et verrucis abutraque parte albicantibus notato Commelini.

A. africana folio triangulo longissimo et angustissimo floribus luteis fetidis. h. Lug. Bd.

Aloides sive aloe folio in oblongum aculeum abeunte. C. Bd.

A. sive aloe americana ex vera cruce foliis latioribus glaucis Kiggellarii.

A. sive aloe americana ex vera cruce foliis angustioribus minus glaucis Kiggellarii.

A. americana polygona Commelini.

A. americana scyllæ foliis amplioribus

Euphorbium tetragonum et pentagonum spinis geminis aduncis munitum. Isnardi.

E. cerei effigie
E. angulosum foliis nerii latioribus. Boerh.
E. heptagonum spinis longissimis in apice frugiferis Boerh.
E. aphyllum caule squamoso tuberoso minus. Boerh.
E. aphyllum facie fructus pini. Boerh.
E. aphyllum caule crasso squamoso ramis in capitis — medusæ speciem cincto Boerh.
E. triangulare erectum. h. Carols-Rhuani
E. antiquorum verum
Tithymaloides lauro cerasi folio non serrato h. Elth.
T. frutescens folio myrti amplissimo Jurt.
Cereus Peruvianus Tabernæ
C. erectus quadrangulus costis alarum instar assurgentibus. Boerh.
C. erectus gracilior spinosissimus spinis albis polygonus Boerh.
C. erectus Curassavicus lanuginosus fructu viridi — spinoso. Paradisi Batavi.
C. Curassavicus erectus maximus fructu rubro non spinoso lanuginosus lanugine alba palescente P. 63.
C. erectus polygonus spinosus per intervalla compressus quasi in articulos. Boerh.
C. Peruvianus major erectus maximus spinis fuscis obsitus flore purpurascente h. Carols Rhuani
C. Curassavicus erectus maximus fructu rubro non spinoso. hermanni.

C. Scandens minor polygonus articulatus S. B.
C. minimus articulatus Polygonus Spinosus Boerh.
C. quinqu'angularis longus erectus articulatus. Linn.
C. triangularis radicosus. Bradeley
C. Scandens minor trigonus articulatus fructu suavis=
=simo S. B.

Opuntia Peruviana Sylvestris Cerei facie —
Spinosissima flore Carneo. B. jussieu.
O. minima flagelli formis. Plumerii
O. vulgo herbariorum. J. B.
O. major validissimis Spinis munita. Just.
O. major validissimis aculeis albicantibus munita
O. folio oblongo media. Just.
O. minima folio Subrotundo. Just.
O. folio oblongo media Spinis creberrimis munita. B.
jussieu.
O. Curassavica minima. Boerh.
O. folio oblongo erecta Spinis creberrimis Longis
flavescentibus munita.

Epiphyllum americanum. Bodroni. S. B.

Melocactus purpurescens Striis in Spicam
Contortis.

Echinomelocactus minor Lactescens tuber culis
Seu mamillis majoribus S. B.
E. minor Lactescens tuberculis minoribus S. B.

Ficoides Seu ficus aisoides africana major
procumbens triangulari folio fructu maximo
Eduli.
S. Seu ficus aisoides africana major procumbens folio —

triangulari ensi formi. hermanni. h. L. B.

3 — F. africana frutescens perfoliata folio triangulari glauco punctato cortice lignoso tenui candido Tourneforti

4 — F. afra folio triangulari glauco perfoliato brevissimo apice spinoso. Boerh. —

5 F. africana folio triangulari lanceolato craenleato Tourneforti.

6 — F. africana folio ensi formi varie inciso aureo, flore pediculo insidente. T. —

7 F. africana a caulos latissimis, crassis et lucidis foliis conjugatis flore aureo amplissimo

8 — F. africana folio ensi formi dilute virente flore aureo brevi pediculo insidente. Tourneforti.

9 — F. africana erecta folio triangulari brevissimo fimbriato glauco Volkameri.

10 — F. afra folio triangulari glauco brevissimo-brevissimo margine non spinoso. Boerh. —

11 — F. africana folio triangulari apice rubro caule purpurascente. Tourneforti —

12 F. africana folio triangulari longo apice rubro caule purpurascente. —

13 — F. africana folio triangulari recurvo floribus umbellatis obsoleti coloris externe purpureis Tourneforti. —

14 F. seu ficus aisoides africana folio longo tenui flore aurantio. Boerh. .

15 — F. afra arborescens folio tereti flore candido noctu aperto interdiu clauso. Boerh.

16 — F. seu ficus aisoides africana erecta arborescens lignosa —

flore radiato primo purpureo dein argenteo interdiu clauso noctu aperto. Boerh.

17 F. africana folio triangulari incurvo et dentato. Tourn

18 F. africana aculeis longissimis perfoliatis nascentibus e foliorum alis. Tournef.

19 F. seu ficus aisoides africana minor erecta folio triangulari glauco flore luteo. h. Lug. Bd.

20 F. arborescens flore purpureo. heukeri

21 F. afra folio triangulari viridi longo aspero flore violaceo. Boerh.

22 F. afra folio triangulari ensi formi brevissimo flore dilute purpurascente filamentoso. Boerh.

23 F. Capensis folio tereti flore albido. Petiverii.

24 F. afra fruticosa caule lanugine argentea ornato folio tereti parvo longo guttis argenteis quasi scabro flore violaceo. Boerh

25 F. nostras Kali folio flore albo. Tournef.

26 F. africana folio tereti in villos radiatos abeunte. Just. Tournef.

27 F. seu ficus aisoides africana folio variegato aspero ad apicem stellâ spinosâ ornato flore violaceo. Boerh

28 F. africana repens et lete virens flore purpureo. Tourn.

29 F. afra folio triangulari longissimo marginibus obtusioribus flore amplo intus pallide aureo extus lineâ rubrâ longâ picto. Boerh.

30 F. seu ficus aisoides africana folio longo tenui flore rubro. Boerh

31 F. Capensis humilis cepæ folio flore stramineo Bradlez

32 F. africana procumbens foliis planis conjugatis lucidis

floribus amplis filamentosis ex albo flavescentibus Bradley.

S. africana folio plantaginis undulato micis argenteis aspero. Tournef. act. acad. R. S.

Ficoidea hispanica folio longiori. Vaillant.

F. americana procumbens portulacæ folio. act. a. R. S.

F. americana procumbens longo levi que folio glauco flore purpureo.

Tetragonocarpos africana frutescens foliis longis et angustis h. amst.

T. africana radice magna crassa et carnosa. h. amst.

Galenia Linnæi

Conocarpus. Linnæi h. clif.

Protea foliis lineari lanceolatis integerrimis h. clif.

Ahouai nerii folio latiore

Jasminonerium. Linnæi

Selago corymbo multiplici. Linn. Specierum

Casvarina littorea. Rumphii.

Elemifera foliis pinnatis. h. clif.

Ammania floribus sessilibus. Linn.

Parkinsonia aculeata foliis minutis uni costæ adnexis. Linn.

Dantia. Petiti. novorum generum Linnæi

Knoxia scandens foliis cordato ovatis pinnulis multipartitis alaribus. Brown

Methonica malabarorum. h. lug. B.

Sibthorpia foliis orbiculatis integris crenatis pedunculis solitariis Linnæi Specierum.

Plantaginella aquatica vulgaris D. Jussieu

Neurada procumbens Linnæi

Cynocrambe Dioscoridis C. B.

Zizania. Linn.

Table des Plantes


Plantes	Leçon	Page	herbier	Plantes	Leçon	Page	herbier
Clifortia......	13..	70.		Corona imperialis	1..	5.	
Clinopodium....	4..	15.		Corona regalis.	1..	5.	
Clutia.........	26..	148.		Corona Solis..	16..	88.	
Clymenum....	20..	112.		Coronilla.....	20..	115.	
Clymus.......	21..	121.		Coronopus....	7..	31.	
Cnicus.........	18..	98.		Cortusa......	6..	29.	
Coffea.........	24..	137.		Corylus.......	23..	130.	
Colchicum.....	1..	2.		Cotinus......	24..	138.	
Coletta Welta...	26..	148.		Cotula.........	15..	81.	
Collinsonia....	5..	21.		Cotyledon....	8..	38.	
Colocinthys....	22..	128.		Crambe.....	8..	37	
Colutea.......	21..	116.		Crassula.....	8..	37.	
Coma aurea..	15..	77.		Crataegus.....	25..	143.	
Commelina...	1..	4.		Crithum....	14..	71.	
Conferva....	12..	59.		Crocus.......	1..	1.	
Conocarpus...	27..	159.		Crotalaria....	20..	110.	
Convolvulus...	11..	56.		Cruciata......	3..	10.	
Conyza.......	15..	76.		Cucubalus.....	10..	48.	
Conyzoides...	15..	77.		Cuminoides...	14..	71.	
Corchorus.....	21..	118.		Cuminum.....	14..	71.	
Corallodendron	20..	112.		Cucumis.....	22..	128.	
Cordia.......	26..	151.		Cucurbita.....	22..	128.	
Coriandrum...	14..	73.		Cujete.......	26..	151.	
Coriaria.....	25..	144.		Cupressus.....	23..	129.	
Corjndum....	13..	66.		Curcuma.....	27..	152.	
Coris.......	4..	18.		Cururu......	13..	66.	
Cornus.......	25..	145.		Cuscuta......	21..	119.	
Cornutia......	26..	147.		Cyanus........	17..	95.	


Plantes	Leçon	Page herbier	Plantes	Leçon	Page herbier
Orobanche...	4..	19.	Periclymenum	24..	136.
Orobanchoïdes..	13..	69.	Periploca....	11..	56.
Orobus......	20..	114.	Perota.......	23..	131.
Osmunda....	22..	126.	Persica.....	25..	141.
Oxicoccus....	24..	136.	Persicaria...	21..	120.
Oxys........	19..	107.	Pervinca....	12..	62.
P			Petasites.....	16..	89.
Paiocaatinga	27	152	Petiveria....	8..	39.
Paliurus......	25..	142.	Peucedanum.	14..	74.
Palma......	26..	146.	Phalangium.	1..	2.
Palmifolia....	26..	146.	Pharnaceum..	10..	51.
Panicum.....	21..	121.	Phaseoloides	20..	112
Papaia......	26..	147.	Phaseolus..	20..	112.
Papaver....	13..	67.	Phellandrium	14..	78.
Parietaria..	21..	120.	Phillyrea.....	23..	133.
Parkinsonia.	27..	159.	Phlomis......	5..	32.
Parnassia....	2..	8.	Phytolaca...	12..	63.
Paronichia...	10..	51.	Pimpinella..	13..	70.
Partheniastrum	15..	79.	Pinguicula..	4..	19.
Pastinaca....	14..	72.	Pinus.......	23..	128.
Pavia.......	25..	144.	Piper.......	11..	53.
Pedicularis.....	4..	18.	Pirus......	25..	143.
Pelecinus.......	20..	114.	Pisonia.....	26..	150.
Pentapetes....	19..	105.	Pisum......	20..	113.
Pentaphylloides	18..	101.	Pitonia.....	9..	45.
Penthorum..	6..	29.	Plantaginella	4..	18.
Pepo........	22..	128.	Plantago.....	7..	31.
Pereskia....	26..	147.	Platanus.....	23..	132.


Plantes	Leçon	Page	herbier	Plantes	Leçon	Page	herbier
Plumbago ...	9..	45.		Ptarmica ...	15..	78.	
Plumeria ...	26..	146.		Ptelea	23..	131.	
Pæonia	2..	8.		Pulmonaria ..	9..	44.	
Poinciana	26..	149.		Pulsatilla	2..	8.	
Polemonium	10..	45.		Punica	25..	145.	
Polium	3..	13.		Pyrola	2..	6.	
Polycarpon ...	10..	51.		**q**			
Polygala	13..	68.					
Polygonatoïdes.	12..	61.		Quamoclite ...	11..	58.	
Polygonatum.	12..	60.		Quercus	23..	129.	
Polygoni folia.	10..	49.		Quinque folium	18..	101.	
Polygonum ...	10..	51.		**r**			
Polypodium ...	22..	127.					
Populago	2..	7.		Rabarbarum ...	8..	39.	
Populus	23..	132.		Randia	26..	148.	
Porophyllum	15..	82.		Ranunculus	2..	8.	
Porrum	1..	5.		Raphanistrum	7..	32.	
Portulaca	8..	37.		Raphanus	7..	31.	
Potamogeton..	12..	60.		Rapistrum	7..	32.	
Primula veris ..	5..	24.		Rapunium	7..	30.	
Proboscidea ...	26..	152.		Rapunculus	7..	31.	
Protea	27..	159.		Rauwolfia	26..	146.	
Prunus	25..	141.		Reseda	9..	42.	
Pseudo accacia	20..	114.		Rhagadiolus ...	17..	91.	
Pseudo brasilium	26..	148.		Rhamnoides	23..	131.	
Pseudo dictamnus	4..	18.		Rhamnus	23..	133.	
Psoralea	19..	108.		Rhus	24..	137.	
Psyllium	7.	31.		Rhuyschiana ..	3..	13.	


Plantes	Leçon	Page	herbier
Thymus....	3..	13.	
Thysselinum	14..	75.	
Tilia........	24..	138.	
Tinus Prior...	24..	136.	
Tithymalus...	11..	54.	
Topiaria....	26..	150.	
Tordylium..	14..	73.	
Tormentilla.	18..	101.	
Toxicodendron	24..	137.	
Trachelium..	7..	30.	
Tragacantha	21..	117.	
Tragopogon..	17..	91.	
Tragoselinum	14..	70.	
Trianthema..	8..	37.	
Tribulus....	19..	107.	
Trichomanes	22..	127.	
Trifolium....	19..	108.	
Triopteris....	13..	66.	
Triosteospermum	24	137	
Triticum......	21..	121.	
Triumphetta.	19..	105.	
Tubularia...	12..	59.	
Tulipa......	1..	5.	
Tulipifera....	24..	137.	
Turritis.....	8..	36.	
Turnera.....	3..	11.	
Tussilago....	16..	89.	
Typha......	22..	123.	
Tythymaloides	27..	155.	

Plantes	Leçon	Page	herbier
V			
Valeriana....	13..	69.	
Valerianella..	13..	69.	
Veratrum....	2..	6.	
Verbascum...	6..	24.	
Verbena.....	4..	15.	
Veronica.....	11..	51.	
Viburnum....	24..	136.	
Vicia.......	20..	113.	
Viola........	11..	58.	
Virga aurea..	16..	83.	
Vitex.......	24..	137.	
Vitis.......	24..	138.	
Vitis idæa....	24..	136.	
Volkameria	23..	133.	
Vulneraria	19..	108.	
Wachendorfia	1..	4.	
U			
Ulmaria.....	13..	70.	
Ulmus.......	24..	135.	
Urena.......	19..	105.	
Urtica.....	21..	119.	
Uvaria......	26..	148.	
Uva ursi....	24	136	
X			
Xeranthemum	17..	81.	









624 *bis* **BOTANIQUE. Manuscrit** d'un cours [professé par **Bernard de Jussieu** (1699-1777]) au Jardin du Roi en 1762. In-4 de x ff. prélim. n. ch., 159 pp. ch. et VIII ff. n. ch., plein vélin vert, pièce maroq. r. au dos, tr. r. (*Rel. anc.*). 250 fr.

Très joli manuscrit, d'une belle écriture, vraisemblablement de la main d'un élève de B. de Jussieu. Il débute par une *Introduction à la connoissance des Plantes*, résumé de l'histoire de la botanique (*Théophraste, Dioscoride, Conrad Gesner, Robert Morisson, Tournefort, etc.*).

Chez Duriac, Cat. XIX
April 1937.

